Peróxido de hidrogénio (água oxigenada)

O peróxido de hidrogénio, H_2O_2 , é um líquido incolor com um cheiro característico, miscível com a água, solúvel em éter dietílico e insolúvel em éter de petróleo, de p.e. $152^\circ C$, que é decomposto por muitos solventes orgânicos. Normalmente é utilizado sob a forma de soluções aquosas 3-90 % estabilizadas por acetanilida. O peróxido de hidrogénio provoca queimaduras. O contacto com materiais combustíveis pode causar incêndios. Evitar o contacto com os olhos e a pele. VLT 1 ppm ($1,5 \text{ mg m}^{-3}$).

Efeitos tóxicos: A inalação do vapor, especialmente em concentrações elevadas, pode causar irritação e inflamação do nariz, garganta e aparelho respiratório. O contacto do líquido com os olhos provoca picadas e lacrimação, podendo resultar em ulceração da córnea. O contacto da pele com o líquido concentrado pode causar manchas brancas temporárias, queimaduras e aparecimento de bolhas. A ingestão do líquido provoca irritação do tracto gastrointestinal e a libertação rápida de oxigénio que origina a distensão do esófago ou do estômago, podendo causar lesões e hemorragias internas graves.

Reacções perigosas: O peróxido de hidrogénio é um agente oxidante muito forte que envolve o risco de explosão. Decompõe exotermicamente para dar oxigénio

e água, sendo a decomposição catalisada por muitos tipos de impurezas, particularmente metais como o paládio, a prata, o cobre, o crómio e o manganês. A energia liberta pela decomposição catalítica de uma solução de 65 % de peróxido de hidrogénio é suficiente para provocar a evaporação de toda a água, permitindo a ignição de substâncias combustíveis. As substâncias celulósicas podem entrar em ignição espontânea quando em presença de um solução peróxido de hidrogénio a 90 %. Os solventes miscíveis com peróxido de hidrogénio, como o etanol e a acetona, podem detonar quando misturados com soluções de peróxido de hidrogénio em concentração superior a 30 %. Encontram-se descritas muitas reacções violentas ou explosivas envolvendo peróxido de hidrogénio e acetaldeído, acetona, acetato de vinilo, ácido acético, ácidos carbóxicos, ácido sulfúrico, álcoois, bases azotadas, carvão activado, cetena, cetonas e ácido nítrico, éter dietílico, fósforo, madeira, metais, óxidos metálicos, pentóxido de fósforo, e numerosos compostos orgânicos.

Perigo de incêndio: Os incêndios envolvendo peróxido de hidrogénio são melhor controlados pelo uso de grandes volumes de água.

Eliminação de resíduos: Manter todas as pessoas afastadas da zona afectada. Usar protecção facial e luvas. Lavar com água e deitar fora, diluindo com muita água corrente.

Amiguinhos, cá estamos de novo para vos apresentar a terceira dose do nosso/vosso novo léxico científico.

Tem sido uma recolha muito afanosa, mas a vida é assim ... cheia de trabalho. O vosso apoio tem sido a razão de ser, para continuar a dotar a Química Portuguesa de mais um instrumento de trabalho. Bem hajam... e meditem muito.

Novo léxico científico — 3.^a dose

pelo Digníssimo Professor Florêncio Vesúvio (1), humanista e crítico científico

Radicais — Pessoas intolerantes

“Trap” de radicais — Quando os primeiros vão dentro dentro

Radicais livres — Quando os segundos são soltos

Molécula reduzida — Molécula tornada mais pequena

Composição molecular — Conjunto de moléculas atreladas umas às outras

Conservação de massa — Não permitir que eles “gatem” a carteira

Balço de massas — Acto de pendular a carteira

Propriedades críticas — Tendência manifestada por certas pessoas para a crítica

Libertação de gases — ... Só nos sanitários

Termoquímica — Química feita com termómetros

Fotoquímica — Química feita com fotos

Ponto triplo — Local onde se escreve, 1×2

Conservação da Energia — Acto de evitar esforços violentos em todas as ocasiões

Pressão reduzida

Professor (na aula teórico-prática) — Fez os cálculos à pressão reduzida?

Aluno — Não Sôr Professor

Professor — Mas eu não o alertei no início da aula para esse pormenor?

Aluno — Alertou ... mas desse modo o lápis não escreve

Prova

Diz o supervisor ao supervisionado — E dá esse produto? ... como o pode provar?

O supervisionado pegou no copo com o produto da reacção, bebeu tudo e exclamou antes de cair — Assim Professorrrrr...

Ponto de ebulição

Professor (no laboratório) — Já chegou ao ponto de ebulição?

Aluno — Não Setôr ..., ainda pode bater mais

Evacuar a sala

Cientista (no gabinete) — Sempre evacuou a sala desses ranhosos dos estudantes para podermos dar a conferência?

Subalterno — Sim Professor, já fizemos o vácuo até 10^{-1} torr ... a sala não veda muito bem. Agora é só tirar os cadáveres.

Adeus ... e meditem muito!

(1) abreviado D. Professor Florêncio Vesúvio