Os produtos fitofarmacêuticos e a saúde

A. M. S. Silva Fernandes ^a

António Manuel Sebastião
Silva Fernandes

Licenciou-se em Engenharia Agrónoma em 1958. Obteve o grau de Ph.D., na Universidade de Bristol, em 1965.

Em 1972 foi nomeado Especialista do MAP, tendo passado a Investigador em 1979. Em 1985 foi nomeado Investigador Principal. Enquanto funcionário do MAP, foi contratado em 1971, pelo ISA, na categoria de Professor Auxiliar em «part-time», tendo sido nomeado Professor Associado Convidado em 1979. Em 1985 obteve o grau de Agregado e em 1986 tomou posse do lugar do quadro do ISA na categoria de Professor Catedrático.

No Instituto Superior de Agronomia é responsável pela Cadeira de Fitofarmacologia a qual lecciona desde 1971. Lecciona ainda esta mesma disciplina nas Universidades de Évora e dos Açores.

Enquanto funcionário do Ministério da Agricultura e Pescas (1959 a 1986) foi responsável pela Secção de Toxicologia do Laboratório de Fitofarmacologia e, seguidamente, Director de Serviços de Toxicologia e Análises da Direcção Geral de Protecção da Produção Agrícola e responsável pela mesma Direcção de Serviços no Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (INIA).

Ao longo da sua actividade no MAP criou e desenvolveu, pela primeira vez em Portugal, um laboratório dedicado a estudos de resíduos de pesticidas, tendo formado uma equipa especializada nestas matérias. Foi ainda o principal responsável pela elaboração e actualização dos critérios de avaliação toxicológica dos pesticidas em Portugal.

Durante a sua carreira científica e docente foram-lhe concedidas várias bolsas de estudo para aperfeiçoamento das matérias à sua responsabilidade, tendo efectuado ainda numerosas visitas de estudo a universidades e laboratórios de investigação de vários países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Participou em dezenas de congressos, simpósios, seminários e outras actividades científicas, a nível nacional e internacional, tendo apresentado comunicações em muitas delas. Realizou colóquios e esteve presente, na qualidade de representante português, em inúmeras reuniões internacionais.

Publicou trabalhos de I-D e de divulgação, em revistas nacionais e estrangeiras, tendo tido mais de uma centena de citações em revistas e livros de autores estrangeiros a trabalhos seus.

Fez parte de vários júris a nível das universidades e do INIA e é responsável científico de alguns projectos de I-D. Foi Presidente da Comissão de Toxicologia de Pesticidas durante quatro anos, sendo actualmente vogal nesta Comissão.

É membro efectivo e pertence ao «Management Committee» do «Collaborative International Pesticide Analytical Council». É perito de «Panels» da FAO e da OMS e ainda, a nível da CEE, do «Scientific Advisory Committee to Examine the Toxicity and Ecotoxicity of Chemical Compounds» e do «Scientific Committee for Pesticides» do qual é, actualmente, vice-presidente.

Introdução

A designação produtos fitofarmacêuticos é atribuída aos pesticidas de uso agrícola, os quais abrangem todos os produtos destinados à defesa da produção vegetal, com excepção dos adubos e correctivos.

Até ao início dos anos 40 o número de produtos fitofarmacêuticos à disposição do agricultor era bastante reduzido, não ultrapassando duas dezenas. Entre eles encontravam-se o arseniato de chumbo, as piretrinas, a rotenona, a nicotina, os óleos minerais, o DNOC, o enxofre, os compostos de cobre e os compostos de mercúrio. Embora algumas destas substâncias tivessem toxicidade aguda elevada – caso do arseniato de chumbo, nicotina, DNOC, e compostos de mercúrio – eram escassos os elementos toxicológicos disponíveis. Sabia-se alguma coisa sobre a sua toxicidade aguda, nomeadamente DL50 oral, mas eram praticamente inexistentes outros estudos de toxicidade aguda, assim como estudos de toxicidade sub-aguda e crónica. No respeitante ao consumidor dos alimentos tratados não havia, na altura, percepção para o problema dos resíduos [1], muito embora pesticidas como o arseniato de chumbo deixassem resíduos por vezes apreciáveis nos produtos tratados [2].

Com a introdução do DDT, no começo dos anos 40, como insecticida de uso agrícola, iniciou-se uma nova era no campo da protecção das plantas, pois que, a partir dessa data, os velhos pesticidas inorgânicos e os de origem vegetal deram lugar aos pesticidas orgânicos de síntese. Desde então assistiu-se à descoberta de centenas de substâncias activas e, passados alguns anos, os agricultores já tinham à sua disposição dezenas de alternativas.

Nos fins de 1989 existiam no mercado nacional 260 substâncias activas, formuladas em cerca de 600 produtos comerciais [3], com um volume de vendas que excedia os 17 milhões de contos.

Entretanto, e desde a descoberta do DDT, as exigências toxicológicas requeridas às firmas produtoras, com vista a assegurar a saúde de aplicadores, outros trabalhadores agrícolas e consumidores dos produtos tratados, têm evoluído de uma forma espectacular, apresentando-se hoje os estudos toxicológicos como uma das principais componentes responsáveis pelo elevado custo de produção de uma nova substância activa. De facto, os produtos fitofarmacêuticos, a par dos medicamentos, são considerados como os produtos mais bem estudados do ponto de vista toxicológico.

^a Instituto Superior de Agronomia, Lisboa

Grupos químicos de produtos fitofarmacêuticos

O número de grupos químicos de substâncias activas comercializadas no nosso País é bastante numeroso [4]. Para termos uma ideia, vejamos o que se passa no campo dos insecticidas, fungicidas e herbicidas, os três tipos de pesticidas com maior número de produtos comercializados a nível nacional. Assim, os insecticidas orgânicos de síntese estão distribuídos em seis grupos, alguns dos quais com diversos subgrupos. Entre eles encontramos os organoclorados, os organofosforados, os carbamatos e os piretróides, os primeiros dos quais tendo tido grande projecção nos anos 40 a 60, mas que por razões de contaminação do ambiente e desequilíbrios biológicos foram sendo retirados do mercado, estando actualmente em comercialização um número muito limitado destas substâncias activas. Por outro lado, organofosforados, carbamatos e piretróides constituem, neste momento, três grupos químicos da maior importância para o combate a pragas.

Como fungicidas continuam-se a utilizar quantidades apreciáveis de produtos inorgânicos, nomeadamente enxofre e compostos de cobre, mas os produtos orgânicos de síntese existentes no mercado são muito importantes, estando distribuídos por doze grupos, alguns dos quais com diversos subgrupos. Destacamos os ditiocarbamatos, os diversos tipos de amidas, as dicarboximidas e os diversos tipos de compostos heterocíclicos, entre os quais se encontram os benzimidazóis e os triazóis. Este último grupo químico, de introdução recente, tem já no país dez substâncias activas, esperando-se a comercialização de outras muito em breve.

Finalmente, entre os herbicidas contamos actualmente com nove grupos químicos, alguns dos quais com vários subgrupos. Entre eles encontramos os ácidos fenoxialcanóicos, os tiocarbamatos, as ureias, vários tipos de amidas e aminas e diversos tipos de compostos heterocíclicos como sejam, por exemplo, os compostos quaternários de amónio, diazinas e triazinas. As ureias e as triazinas são os dois grupos de herbicidas com maior número de substâncias activas comercializadas a nível nacional, mas são também dos grupos químicos com menos riscos para a saúde humana.

Os riscos toxicológicos dos produtos fitofarmacêuticos

Os riscos toxicológicos dos pesticidas de uso agrícola iniciam-se a nível da síntese dos produtos técnicos e dos diferentes processos fabris de formulação e mantêm-se durante as fases de transporte, distribuição, armazenamento, comercialização e aplicação.

Após esta existem ainda riscos toxicológicos para os trabalhadores de campo envolvidos em diversas práticas culturais e para o consumidor dos produtos agrícolas tratados. Neste trabalho vamos debruçar-nos, exclusivamente, sobre os aspectos toxicológicos relacionados com o aplicador, os outros trabalhadores de campo e com o consumidor dos produtos tratados.

Aplicador de pesticidas

Se fizermos uma comparação entre os valores das DL50 orais e cutâneas, para ratos e coelhos, dos vários tipos de produtos

fitofarmacêuticos, verificamos que no caso dos insecticidas temos produtos altamente selectivos para animais de sangue quente, como sejam os casos do carbanil, malatión e diflubenzurão e outros muito pouco selectivos, como sejam os casos do aldicarbe, mevinfos e paratión. De facto, os valores das DL50 orais dos primeiros variam entre 850 e 4640 mg/kg de peso vivo e os valores das DL50 dos segundos entre 0,93 e 13 mg/kg de peso vivo [5, 6]. Podemos afirmar que o grupo dos insecticidas é muito heterogéneo em relação à sua selectividade para o homem, uma vez que é constituído por pesticidas muito pouco tóxicos e outros extremamente tóxicos, de que os produtos acima referidos são exemplos típicos. Alterações ligeiras na molécula de um insecticida altamente tóxico podem conduzir à obtenção de produtos mais selectivos. O caso do paratión-metilo e do fenitrotión, ambos comercializados no mercado nacional, mostram que a introdução neste último de um grupo metilo na posição *meta* do anel fenilo, também designado por «mágico» *m*-metilo [7], aumenta substancialmente os valores das DL50 oral e cutânea (Quadro 1). Alterações deste tipo são desejáveis, mas até há pouco tempo as empresas de pesticidas não eram incentivadas neste sentido. Com a introdução do conceito de protecção integrada [8] e com o desenvolvimento desta prática, nomeadamente a partir dos anos 80, as firmas de pesticidas estão procurando sintetizar moléculas de baixa toxicidade. No grupo dos acaricidas específicos verifica-se uma selectividade apreciável das diversas substâncias activas para o homem, com excepção do azociclo estanho com um valor de DL50 oral de 99 mg/kg de peso vivo, o mesmo acontecendo nos grupos dos fungicidas e herbicidas [5, 6]. De facto, nos fungicidas comercializados em Portugal, só o arsenito de sódio tem um baixo valor de DL50 oral (10 mg/kg de peso vivo) verificando-se que a maioria dos outros fungicidas apresenta valores bastante elevados. O DNOC e o paraquato são os únicos exemplos de herbicidas de baixa selectividade, com valores de DL50 orais de 25 mg/kg de peso vivo, respectivamente em ratos e cães. Já no campo dos nematodocidas e dos fumigantes encontramos diversos produtos muito pouco selectivos. Nos primeiros o fenamifos, com um valor de DL50 oral de 10 a 15 mg/kg de peso vivo e o oxamil, com um valor de DL50 de 5,4 mg/kg de peso vivo, são exemplos típicos. Nos segundos, temos como exemplos os gases brometo de metilo, com um valor limite de toxicidade para o homem de 0,065 mg/l de ar e a fosfina, com um valor limite de 0,01 mg/l de ar [5, 6].

O agricultor tem à sua disposição cerca de 600 produtos comerciais que foram previamente estudados do ponto de vista toxicológico pela Comissão de Toxicologia dos Pesticidas, tendo a todos eles sido atribuída uma classificação toxicológica, e definidas precauções de utilização depois de analisados os resultados dos estudos de toxicidade aguda oral, cutânea e inalatória, assim como os testes de irritação da pele e olhos e de sensibilização cutânea. Para os produtos mais tóxicos são requeridas precauções especiais, nomeadamente material de protecção que reduza a contaminação por via cutânea ou inalatória. Em aplicações ao ar livre a contaminação por via cutânea é significativamente a mais importante; em recintos fechados, como estufas e armazéns, a via mais importante poderá ser a cutânea ou inalatória, conforme o tipo de pesticida e a técnica de aplicação utilizados.

Dado que o agricultor nem sempre lê o rótulo ou, caso o leia, se recusa a utilizar material de protecção adequado, são frequentes as intoxicações acidentais com pesticidas resultantes de uma utilização incorrecta.

Nome vulgar	Fórmula de estrutura	DL50 mg/kg peso vivo oral	DL50 mg/kg peso vivo cutânea
paratíio-metilo		14-24	67
fenitrotíio		800	890-1200

QUADRO 1
Valores de DL50 de organofosforados

As intoxicações ocorrem normalmente durante a aplicação de organofosforados e por vezes só após vários dias de utilização contínua deste tipo de insecticidas. Tanto os organofosforados como os carbamatos são inibidores da enzima acetilcolinesterase, a qual desempenha papel fundamental na hidrólise da acetilcolina ao nível do sistema nervoso [9, 10]. Todavia, no caso dos organofosforados a fosforilação da enzima é um processo bastante estável, mantendo-se o bloqueamento durante tempo apreciável, de tal forma que o trabalhador pode ser sujeito a redução progressiva de acetilcolinesterase ao longo de vários dias de trabalho até atingir níveis críticos de acetilcolinesterase. Daí a ocorrência de muitas intoxicações com este tipo de insecticidas em trabalhadores agrícolas, nomeadamente com produtos como o paratíio-etilo que têm um valor de DL50 cutânea baixo. No caso dos carbamatos a carbamilação da enzima é um processo bastante menos estável, dado que o éster formado é rapidamente hidrolisado. Nestas circunstâncias o aplicador, para sofrer intoxicação grave, terá de absorver uma quantidade apreciável do produto num curto espaço de tempo, o que já não será tão frequente.

De facto, se designarmos por E a enzima acetilcolinesterase e IX o insecticida inibidor (organofosforado ou carbamato) teremos em qualquer dos casos o seguinte processo:

No caso dos organofosforados, a concentração de E.IX, no qual o inibidor está ligado por forças de Van der Waals, é normalmente baixa, dado que a constante de velocidade K_3 é elevada. Assim, K_2 será baixa e elevada a concentração de E.I onde o inibidor se encontra agora unido por ligações covalentes. Por outro lado, a constante de velocidade K_4 é baixa. Se se tratar de um carbamato, a concentração de E.IX é normalmente elevada, dado que a constante de velocidade K_3 é baixa. Verifica-se, ainda, que a constante de velocidade K_4 é elevada e que K_2 pode ser igualmente elevada [11].

Para reduzir o risco de intoxicação do aplicador durante a preparação da calda ou durante a aplicação, tem havido um esforço das empresas de pesticidas no sentido de apresentarem tipos de formulações mais seguras. É conhecido o risco de manuseamento de concentrados para emulsão, os quais contêm solventes orgânicos que facilitam a penetração cutânea. A sua substituição por suspensões aquosas concentradas é uma excelente alternativa. Também o manuseamento de pós molháveis, com alto teor em substância activa, e que têm que ser pesados no campo, constituem um risco, e igualmente neste caso a sua substituição por grânulos dispersíveis, sem pó, e que são medidos pelo agricultor, constituem outra excelente alternativa.

Por outro lado, a utilização de suspensões aquosas de micro-encapsulados reduz drasticamente os valores das DL50 cutâneas, mesmo quando essas formulações contêm substâncias activas de toxicidade elevada, como seja o paratíio-etilo, tornando-se assim bastante mais seguras para o aplicador a utilização deste tipo de substâncias. Infelizmente, as técnicas fabris a utilizar para estes três diferentes tipos de formulações são sofisticadas e ainda não utilizadas em Portugal, sendo de origem estrangeira todas estas formulações comercializadas no País.

No caso particular do insecticida aldicarbe, um carbamato com um valor de DL50 cutânea de 5 mg/kg de peso vivo, houve necessidade de revestir a formulação de grânulos, contendo 10% de substância activa, com uma resina que só permite a libertação do aldicarbe após o grânulo contactar com água. Desta forma, o manuseamento do produto é considerado seguro, uma vez que o valor da DL50 cutânea da formulação é bastante elevado.

Ainda no sentido de reduzir o risco de intoxicação do aplicador durante a preparação da calda, estão a ser canalizados esforços no sentido de introduzir no mercado internacional produtos cujas embalagens sejam solúveis na água. Tendo as embalagens quantidades de produtos exactas, o agricultor não terá que as abrir, pesar ou medir, mas somente proceder à introdução da embalagem fechada dentro do correspondente volume de água.

Alguns produtos fitofarmacêuticos, embora formulados com substância activa de baixa toxicidade aguda, podem causar problemas graves ao aplicador. Assim, por exemplo, o insecticida organofosforado malatíio, quando formulado em pós molháveis contendo certo tipo de adjuvantes pode, quando armazenado em condições de temperatura elevada, conduzir à formação da impureza tóxica isomalatíio, a qual já foi responsável por centenas de intoxicações e até mortes de preparadores de caldas e aplicadores [12]. O 2,4,5-T, um herbicida muito importante, deixou de ser comercializado por conter uma impureza de fabrico o 2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina, uma das substâncias químicas mais tóxicas que o homem conheceu até hoje (DL50 oral de 22 µg/kg de peso vivo). Nos anos 60, os herbicidas com base em 2,4,5-T, em comercialização a nível internacional, doseavam níveis desta impureza da ordem de 50 ppm com grandes riscos para o aplicador. Embora o processo de fabrico tenha sido substancialmente melhorado e os produtos comerciais ultimamente no mercado doseassem valores de dioxinas abaixo de 0,1 ppm, o seu desaparecimento do mercado foi um processo irreversível, dada a elevada toxicidade aguda e crónica da

impureza em causa. De igual forma, certos grupos de substâncias activas em cujo processo de síntese entram as aminas secundárias e o ácido nítrico ou nitroso são passíveis de formar nitrosaminas ou nitrosamidas, a maioria das quais têm-se revelado com características oncogénicas. De facto, níveis de nitrosaminas da ordem de 150 ppm foram doseados em certos grupos químicos de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente no grupo das aminas, de que é exemplo o herbicida trifluralina [12], valores que foram considerados de risco elevado para o aplicador. O processo fabril destes pesticidas tem sido substancialmente melhorado, de forma a garantir produtos fitofarmacêuticos isentos destas impurezas ou com níveis inferiores a 1 p.p.m.

O nematodocida 1,2-dicloro-3-cloropropano foi retirado do mercado porque, para além das suas características mutagénicas e oncogénicas, afectava o aparelho reprodutor do homem, tendo causado esterilidade em trabalhadores responsáveis pela sua produção e, portanto, pondo igualmente em risco o aplicador [13, 14]. O herbicida nitrofená também foi retirado do mercado, dado que as suas características mutagénicas, oncogénicas e teratogénicas poderiam afectar o aplicador [15].

No momento presente, uma das empresas responsáveis pela comercialização do acaricida hidróxido de triciclohexilés-tanho retirou voluntariamente o produto do mercado internacional uma vez que, sendo um produto teratogénico, punha em risco os fetos das mulheres grávidas que sazonalmente procediam à aplicação deste produto em culturas do Estado da Califórnia.

Muito recentemente, foram reconhecidos efeitos teratogénicos dos herbicidas bromoxinilo e ioxinilo, pertencentes ao grupo químico dos benzonitrilos, em estudos em que os produtos foram aplicados por via cutânea. Após reavaliação do risco para o aplicador destes herbicidas concluiu-se que com a utilização do material de protecção especial, sempre que se executem tarefas de preparação de calda e pulverização, as pessoas envolvidas no seu manuseamento ficavam devidamente salvaguardadas.

Outros trabalhadores agrícolas

Após a pulverização dos produtos fitofarmacêuticos, as superfícies das folhas e dos frutos ficam cobertas com um depósito de pesticida que após as primeiras alterações – dissipação por acção mecânica ou física, degradações químicas ou enzimáticas – passa a ter a designação de resíduo. Parte do resíduo pode penetrar para o interior do tecido vegetal e outra parte ficar adsorvida ou fracamente aderente à superfície vegetal. O seu tempo de vida depende das características físicas e químicas do produto em causa, do tipo de cultura tratada e ainda das condições climáticas. Durante o processo de degradação podem formar-se produtos de activação, conversão ou desactivação toxicológica.

Os trabalhadores que entram nos campos tratados para procederem a diferentes práticas agrícolas, que envolvam contacto directo com as culturas, provocam facilmente o desalojamento dos resíduos fracamente aderentes, os quais produzem localmente concentrações elevadas de aerossol contaminado com pesticida que, na sua queda, contamina o trabalhador.

Isto pode acontecer de uma forma significativa em campos de vinha, algodão, tabaco e ainda em pomares durante a execução de práticas culturais que envolvam contacto prolongado com a folhagem como sejam a colheita de frutos, a monda, a poda ou a contagem de insectos.

Numerosos casos de intoxicação têm sido registados na Califórnia, com trabalhadores ocupados na colheita de frutos. As intoxicações têm-se verificado, por vezes, em trabalhadores que entram nos campos várias semanas após os tratamentos e têm ocorrido fundamentalmente com insecticidas do grupo dos organofosforados, nomeadamente com aqueles que têm um valor de DL50 cutânea baixo e que formam oxi-análogos como produtos de activação. O paratíio-etilo, paratíio-metilo, azinfos-etilo, azinfos-metilo, etíio, fentíio e dioxatíio são alguns exemplos de insecticidas que podem provocar intoxicações deste tipo.

O índice de risco para o trabalhador dependerá do quantitativo de resíduo desalojável existente sobre as culturas e dos diferentes compostos entretanto formados [16]. Assim, no caso do paratíio-etilo, um tiofosfato, o índice de risco será tanto maior quanto mais elevada for a razão paraoxon-paratíio existente sobre as folhas. De facto, o oxi-análogo do paratíio é 10 vezes mais tóxico do que o paratíio e penetra bastante mais rapidamente através da pele.

O quantitativo de resíduo desalojável depende do tipo de formulação e volume da calda utilizados, assim como da quantidade de chuva caída nos dias seguintes ao tratamento. Por outro lado, o quantitativo e a persistência dos oxi-análogos depende da quantidade e tipo de pó do solo depositado sobre a superfície folhear. Assim, pós molháveis, aplicações a baixo volume, tempo seco e quente e níveis elevados de pó de certos solos argilosos são factores decisivos, quer para uma formação apreciável de resíduos desalojáveis, quer para a produção de taxas elevadas de oxi-análogos [17, 18, 19]. Por outro lado, chuva depois do tratamento reduz o resíduo desalojável de uma forma apreciável e, concomitantemente, o risco de intoxicação do trabalhador agrícola [20]. Embora os resíduos desalojáveis se encontrem nas folhas e frutos, são as folhas que contribuem de uma forma bastante mais significativa para a contaminação do trabalhador, dados os elevados valores da superfície folhear quando comparada com a dos frutos.

As zonas do corpo mais atingidas dependem das culturas e das práticas culturais, sendo as mãos e os antebraços as partes do corpo mais atingidas em operações de colheita de frutos em pomares de citrinos e pessegueiros.

A intoxicação dos trabalhadores verifica-se essencialmente por absorção cutânea dos resíduos existentes nas folhas e no solo. A inalação tem, por outro lado, uma contribuição negligível no processo de intoxicação.

Uma vez que a intoxicação resulta de uma inibição da acetilcolinesterase, é necessário estabelecer valores diários de inibição que conduzam, no fim do trabalho, a um valor de inibição seguro e aceitável do ponto de vista legal. Na Califórnia, o valor máximo admissível é de 40%, tendo-se concluído que inibições diárias de 2% a 4% (ter em atenção a reversibilidade da inibição e a regeneração da enzima) em trabalho continuado ao longo de um a dois meses conduz a um valor final de inibição inferior a 40% [21].

Para evitar este tipo de intoxicações estabelecem-se interva-

los de reentrada – tempo durante o qual o trabalhador está proibido de entrar num campo tratado para executar tarefas que envolvam contacto prolongado com a cultura tratada. Os intervalos de reentrada garantem que a entrada do trabalhador só se verificará depois dos resíduos desalojáveis existentes sobre as folhas terem atingido níveis seguros do ponto de vista toxicológico. Os intervalos de reentrada estarão dependentes do pesticida e dose aplicadas, da cultura e da área geográfica. A Environmental Protection Agency, dos Estados Unidos, já fixou intervalos de reentrada a nível nacional. Vários Estados daquele País, nomeadamente a Califórnia, têm os seus próprios intervalos de reentrada, que no caso do paratião-etilo atingem os 60 dias [22]. A nível da Europa já foram estabelecidos em alguns países do Leste e a CEE, na actual proposta de legislação sobre homologação de produtos fitofarmacêuticos a nível comunitário, está a introduzir exigências nesse sentido. Em Portugal pensamos que, nomeadamente, a área geográfica do Algarve pode reunir condições para a produção de resíduos desalojáveis com um índice de risco apreciável, embora até ao momento não se tenham efectuado estudos conducentes ao esclarecimento da situação.

Consumidor de alimentos tratados

Na altura da colheita é frequente encontrarem-se, nas culturas tratadas, resíduos dos produtos fitofarmacêuticos aplicados e dos respectivos produtos de degradação e metabolização. O nível e composição desses resíduos dependerá de vários factores, nomeadamente do pesticida aplicado, doses e concentrações, número de aplicações, intervalo entre a última aplicação e a colheita, tipo e estado fenológico da cultura e condições climáticas desde o início dos tratamentos até à colheita.

Para garantir a saúde do consumidor estabelece-se para cada pesticida uma dose diária de ingestão aceitável para o homem, expressa em miligramas do produto por quilo de peso vivo. Para se chegar a este valor, há necessidade de submeter o produto fitofarmacêutico a estudos toxicológicos subcrónicos e a estudos especiais de toxicidade, entre os quais destacamos estudos de ingestão de três meses a dois anos em ratos e cães, estudos de oncogenia de 18 a 30 meses em ratinhos e ratos, estudos de reprodução durante duas gerações em ratos e estudos de teratogenia em coelhos e ratos. São ainda essenciais uma bateria de testes de mutagenia *in vitro* e *in vivo* com bactérias e células de animais, assim como estudos de metabolização. Caso se verifique que nas plantas se formam metabolitos suspeitos, estes são isolados e estudados individualmente do ponto de vista toxicológico.

Com base nos estudos acima referidos define-se o nível máximo que não provoca efeitos observáveis nos animais e, a partir destes, procede-se à extrapolação para estabelecer a dose máxima de ingestão aceitável para o homem, utilizando para o efeito, um factor de segurança variável. Este valor é, em princípio, igual em todos os países, muito embora certos serviços oficiais responsáveis pela homologação e organizações internacionais, como a FAO/OMS e CEE, possam, em certos casos, dar uma interpretação aos estudos toxicológicos que os conduzam a definirem níveis sem efeitos observáveis nos animais e factores de segurança diferentes. Estas diferen-

ças não são normalmente muito significativas de forma que a dose diária de ingestão aceitável para o homem é geralmente igual ou muito semelhante a nível dos diferentes países. Aliás, a FAO/OMS publicam anualmente listas de substâncias activas como os níveis definidos por estas duas Organizações, níveis estes que são utilizados por muitos países.

Em Portugal, a Comissão de Toxicologia dos Pesticidas, após análise dos processos toxicológicos apresentados pelas empresas, define o nível máximo que não provoca efeitos observáveis nos animais, assim como o factor de segurança a utilizar e calcula a dose diária máxima de ingestão aceitável para o homem. Seguidamente, aprecia os níveis de resíduos presentes nas culturas em aplicações efectuadas de acordo com o conceito de boa prática agrícola [23] e verifica se a totalidade de resíduos ingeridos nos diversos alimentos tratados com o pesticida em estudo são inferiores ao nível diário de ingestão aceitável. Caso isso se verifique, esses valores são adoptados como os limites máximos de resíduos, definindo-se então, para as diferentes culturas, os intervalos de segurança – tempo mínimo entre a última aplicação dos pesticidas e a colheita – os quais garantirão aqueles limites e que são seguros para o consumidor.

Porque o conceito de boa prática agrícola difere de país para país, nomeadamente quando se comparam países de condições climáticas muito diferentes, os níveis de resíduos na altura da colheita para o par pesticida/cultura poderá ser muito diferente. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, as doses, concentrações e número de aplicações necessárias ao combate eficaz de uma praga ou doença são, normalmente, superiores aos dos países da CEE. Como resultado, os limites máximos de resíduos estabelecidos pelos Estados Unidos são, em muitos casos, mais elevados do que os da CEE [24, 25]. A FAO/OMS também estabelece limites máximos de resíduos que têm em linha de conta as práticas agrícolas de todos os países e, sempre que viável do ponto de vista toxicológico, representam a envolvente dos níveis dos resíduos na altura da colheita do maior número de países possível. Por essa razão, os limites da FAO/OMS também são, normalmente, mais elevados do que os da CEE [26].

Em Portugal estão estabelecidos intervalos de segurança desde 1962 e, muito recentemente, foi publicada legislação que adopta oficialmente os limites máximos de resíduos estabelecidos a nível comunitário.

Nos últimos anos tem-se questionado se as populações não estarão a ingerir resíduos de certos pesticidas acima dos níveis seguros. Para esclarecer esta questão, os cálculos de ingestão diária poderão ser efectuados com base nos limites máximos de resíduos e serão designados por ingestões máximas teóricas, ou poderão ter por base estudos de monitorização, estudos em cestos de compras («market basket studies») ou estudos de dietas totais [27, 28]. Os últimos são os que mais se aproximam dos níveis reais de ingestão, mas são raros os países que os executam. Em Portugal procedemos a estudos de monitorização desde há cerca de 25 anos verificando-se que apenas pontualmente chegarão ao consumidor um ou outro produto alimentar com resíduos superiores aos limites máximos admissíveis, situação esta que resulta de os agricultores nem sempre respeitarem as indicações aprovadas e inscritas nos rótulos,

nomeadamente o intervalo de segurança. Todavia, de uma forma global, os dados obtidos evidenciam que os resíduos ingeridos pela população se encontram muito abaixo dos níveis máximos teóricos calculados.

Referências

- [1] Gunther, F. A. – Insecticide Residues in California citrus fruits and products. *Residue Rev.*, **28**, 1-121, 1969.
- [2] Silva Fernandes, A. M. S., Sousa, M., Fernandes, B. & Serôdio, M. – Arseniato de chumbo em rama de batateira. In *Relatório dos estudos realizados no Sector de Toxicologia do Laboratório de Fitofarmacologia*, 30-32, LT(D)-1/61, Oeiras, 1961.
- [3] Nunes, J. C. – *Lista dos produtos fitofarmacêuticos com venda autorizada*. CNPPA, Oeiras, 1989.
- [4] Silva Fernandes, A. M. S. – *Classificação química de produtos fitofarmacêuticos*. Instituto Superior de Agronomia, FL-1/89, Lisboa, 1989.
- [5] Hartley, D. & Kidd, H. (Ed.) – *The agrochemicals handbook*. Royal Society of Chemistry, Nottingham, 1987.
- [6] Worthing, C. R., (Ed.) – *The pesticide manual*. British Crop Protection Council, Thornton Heath, 1987.
- [7] Hollingworth, R. M. – Strategies in the design of selective insect toxicants. In Street, J. (Ed.) – *Pesticide selectivity*, 67-111, Marcel Dekker, New York, 1975.
- [8] Amaro, P. – *A protecção integrada em agricultura*. Comis. Nac. Ambiente, Lisboa, 1982.
- [9] OMS – Organophosphorus insecticides. A general introduction. *Environ. Health Criter.*, **63**, 1986.
- [10] OMS – Carbamate pesticides. A general introduction. *Environ. Health Criter.*, **64**, 1986.
- [11] Hassel, K. A. – *The chemistry of pesticides*. Verlag Chemic., Basel, 1982.
- [12] Silva Fernandes, A. M. S. – Impurezas e produtos de degradação tóxicos em formulações de pesticidas. *I Congr. port. Fitiat. Fitofar.*, **7**, 55-77, SCAP/SPFF, Lisboa, 1980.
- [13] United Nations – *IRPTC Bull.*, **4**, (2), 20, Geneva, 1981.
- [14] United Nations – *IRPTC Bull.*, **7**, (2), 24, Geneva, 1985.
- [15] United Nations – *IRPTC Bull.*, **4**, (1), 15, Geneva, 1981.
- [16] Spear, R. C. – Technical problems in determining safe re-entry intervals. *J. Environ. Pathol. Toxicol.*, **4**, 293-304, 1980.
- [17] Spear, R. C., Lee, Y. S., Leffingwell, J. T. & Jenkins, D. – Conversion of parathion to paraoxon in foliar residues; effect of dust level and ozone concentration. *J. Agr. Food Chem.*, **26**, 434-436, 1978.
- [18] Adams, J. D., Iwata, Y. & Gunther, F. A. – Worker environment research. IV. The effect of dust derived from several soil types on the dissipation of parathion and paraoxon dislodgeble residues on citrus foliage. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, **15**, 547-554, 1976.
- [19] Gunther, F. A., Iwata, Y., Carman, G. E. & Smith, C. A. – The citrus reentry problem: research on its causes and effects and approaches to its minimisation. *Residues Rev.*, **67**, 1-132, 1977.
- [20] Guthrie, F. E., Domanski, J. J., Chasson, A. L., Bradway, D. E. & Monroe, R. J. – Human subject experiments to estimate reentry periods for monocrotophos-treated tobacco. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, **4**, 217-225, 1976.
- [21] Pependorf, J. L. & Leffingwell, Y. T. – Regulating OP pesticide residues for farm worker protection. *Residue Rev.*, **82**, 125-201, 1982.
- [22] Knaak, J. B. – Minimizing occupational exposure to pesticides: - techniques for establishing safe levels of foliar residues. *Residue Rev.*, **75**, 81-96, 1980.
- [23] Vaz, A. – *Relatório síntese da 21ª reunião do Codex Committee on Pesticide Residues*, CNPPA, Oeiras, (PPA(Tr)-6/89), 1989.
- [24] Duggan, R. (Ed.) – *Pesticide Chemical News Guide*. Food Chemicals News, Inc., Washington D. C., 1988.
- [25] CEE – Directives 76/895 e 86/362 – *J. Ofic. Comunid. europ.* Nº L 340/26 de 9/12/76; 234/1 de 9/8/82; 221/37 de 7/8/86 e 126/53 de 20/5/88.
- [26] Codex Alimentarius Commission – *Guide to Codex recommendations concerning pesticide residues*. FAO/WHO, Rome, 1986.
- [27] Bates, J. A. R. & Gorbach, S. – *Recommended approach to the appraisal of risks to consumer from pesticide residues in crops and food commodities*. IUPAC, 1987.
- [28] UNEP/FAO/WHO – *Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues*. WHO, Geneva, 1989.

ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL EDUCATION

25-30 August 1991

University of York
York, U.K.

BRINGING CHEMISTRY TO LIFE

Organizado pelo Committee on Teaching of Chemistry da International Union of Pure and Applied Chemistry e a Royal Society of Chemistry em conjugação com a UNESCO e a ASE.

Para mais informações contactar: Dr. J. F. Gibson
The Royal Society of Chemistry
Burlington House, Piccadilly
London W1V 0BN
Grã-Bretanha

O 12.º ENCONTRO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA decorre em Coimbra de 10 a 13 de Março de 1991 segundo o tema «Química, Indústria e Ambiente».

Constará de Lições Plenárias, Lições Temáticas (30 minutos), Comunicações Orais (15 minutos) e apresentações de Painéis sujeitos a discussão individual (5 minutos) em sala própria.

LOCAL

As sessões decorrerão no Departamento de Química e no Auditório da Universidade de Coimbra onde também funcionará o Secretariado.

ORGANIZAÇÃO

Comissão Científica: A. Rocha Gonçalves (Presidente), A. J. Andrade Gouveia, Fernando A. Alves, José R. Redinha, João O. Cabral, Sebastião Formosinho, A. J. C. Varandas, José L. Figueiredo, A. Romão Dias e C. Nieto de Castro.

Comissão Organizadora: A. Rocha Gonçalves (Presidente), Maria Luísa Leitão, Carlos Paliteiro, Luís Arnault, Emília Azenha, A. Canelas Pais e Maria Elisa Serra.

TEMAS

- A – Química Física
- B – Química Orgânica
- C – Química Inorgânica
- D – Biotecnologia
- E – Química e Ambiente
- F – Química e Indústria

12.º ENCONTRO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA

QUÍMICA
INDÚSTRIA
AMBIENTE

10 A 13 DE MARÇO DE 1991

COIMBRA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Comissão Organizadora
12.º Encontro da SPQ
Departamento de Química
Universidade de Coimbra
3049 COIMBRA

Si vous tousssez

PRENEZ DES

PASTILLES GERAUD