Química (e Cor) de Metalocenos*

A. ROMÃO DIAS

Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, 1049-001, Lisboa, Portugal

Na primeira parte deste artigo descreve-se brevemente o nascimento da química organometálica moderna com a descoberta accidental do ferroceno em 1951 e a elucidação da natureza da sua ligação química em 1952. De facto já eram conhecidos alguns compostos que hoje classificamos de compostos organometálicos tais como carbonilos metálicos, alquilos de zinco, entre outros, sendo de destacar, pelo seu carácter “exótico” para a época, o sal de Zeise $\text{Na}[\text{PtCl}_3\text{C}_2\text{H}_4]$ descoberto em 1827 mas cuja ligação química só foi compreendida após a elucidação da ligação no ferroceno. Dos metallocenos ou compostos “sandwich” tipo ferroceno passamos para os chamados metallocenos dobrados e, em particular, são descritos alguns resultados “clássicos” e recentes da química dos ditiolatos $(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{M}(\text{SR})_2$ como ligandos organometálicos coordenando-se a outro metal M. A mensagem geral é uma apologia da química organometálica.

1. INTRODUÇÃO

A Direcção da Sociedade Portuguesa de Química decidiu que o XVI Encontro Nacional da SPQ seria realizado em Guimarães, Setembro de 1998, e teria como tema A COR. Dada a minha longa ligação aos destinos da SPQ, raramente falto a um Encontro Nacional; eles começaram por ser e deviam continuar a sê-lo, a Grande Festa dos químicos portugue-

ses. Devo, porém, confessar que naquele caso não estava muito motivado em participar. A razão é simples: o tema era a cor e a minha investigação não está directamente relacionada com aquele tema. Aconteceu, no entanto, que um grupo de amigos simpáticos propôs o meu nome para recipiente do Prémio Ferreira da Silva de 1998 e o júri teve a bondade de aprovar essa proposta. Nestas circunstâncias, eu tinha mesmo de ir a Guimarães proferir a Lição Ferreira da Silva, não havia forma de escapar. Para agravar ainda mais as coisas, o meu amigo Hernâni Maia, num simpático bilhete que me enviou, pedia-me para não me esquecer que o tema do Encontro era A COR. E então comecei a pensar: já que não podia pegar o tema de frente, procurei maneira de o pegar de cernelha.

A minha actividade científica tem sido essencialmente centrada na síntese de compostos organometálicos de metais de transição. Ora, como todos sabemos, salvo alguns casos de compostos, principalmente com metais d^0 , os complexos de metais de transição têm uma variedade e uma intensidade cromática impressionantes. Assim eu poderia, falando de química dos metallocenos, aderir um pouco ao tema, referindo as maravilhosas cores desses compostos. A segunda linha de ataque foi, com a ajuda dos meus amigos Adelino Galvão e Luís Veiros, fazer uns acetatos todos bonitinhos e cheios de cores, que como é óbvio, não posso reproduzir neste artigo (arruinaria a SPQ!). Para quem trabalha em síntese de metais de transição, a cor das soluções e dos cristais (os cristais são o clímax do prazer para um químico de síntese) é objecto de enorme atenção e há mesmo fetiches sobre se esta ou aquela cor é bom sinal ou mau sinal. E foi então que me lembrei de uma canção muito popular na minha juventude, Teus olhos castanhos, cantada pelo, na altura, famoso Francisco José (aliás irmão do não menos famoso Prof. Galopim de Carvalho). Decidi, então, com a ajuda da Ana Galvão, na altura minha estudante de doutoramento, glosar livremente a ideia aplicando-a às cores dos cristais e surgiram os versos que se seguem.

Ainda contemplei a possibilidade de, no início da lição, cantar esta versalhada com a música da canção inspiradora. Perante esta ideia, os meus amigos ficaram em pânico: é sabido que quando eu canto, ou falo alemão, a rejeição da Natureza é tal que até as lâmpadas caem do tecto. Face a isso desisti, com grande pena minha, de cantar.

Alberto Romão Dias nasceu em Lisboa em 1941. Licenciou-se em Engenharia Químico-Industrial no Instituto Superior Técnico (IST) em 1964, sendo monitor de química analítica no ano lectivo 1963/64 e nos dois anos seguintes 2º Assistente além do quadro. De Setembro 1966 a Janeiro de 1970, data em que obteve o doutoramento, trabalhou sob a

supervisão do Doutor Malcolm L.H.Green, no Inorganic Chemistry Laboratory da Universidade de Oxford, onde se iniciou na química organometálica, em geral, e na química dos metallocenos dobrados, em particular.

Quando regressou a Portugal criou no IST, no âmbito do então Centro de Estudos de Química Nuclear (hoje Centro de Química Estrutural), o primeiro grupo de química organometálica de metais de transição a funcionar no país. Durante cerca de 30 anos muitas foram as teses de doutoramento e mestrado nas áreas da química organometálica e catálise homogénea que se realizaram, total ou parcialmente, no seu laboratório.

É, desde Dezembro de 1979, Professor Catedrático de química inorgânica no IST.

Foi Secretário Geral da Sociedade Portuguesa de Química (1978-88) e Presidente da mesma (1989-91).

Cristais castanhos... e de outras cores!

Os cristais castanhos
De encantos tamanhos
Dão um trabalhão
São estrelas fulgentes,
Brilhantes, luzentes
Caindo na solução.

Os vermelhos, cor de sangue,
São os mais apetecidos
Tê-los puros pôs-me exangue,
Mas os referees foram vencidos.

Cristais verdes são traição,
São cruéis como punhais,
Davam boa difracção
Mas já não difractam mais...

O preto é mau sinal
Fico logo mal disposto
Tanto trabalho afinal
E está tudo decomposto.

Cristais azuis são ciúme
Feitos noutra bancada
Copiando ficava impune
Mas não consegui nada.

Cristais brancos, frustração
Ligando não coordenado,
Lá se foi a ilusão...
Adeus tese e ordenado.

Amarelos são instáveis
Quando são do dihidreto
Mas são muito mais estáveis
Se forem do difluoreto.

A.R. Dias e Ana Galvão, resultados não publicados.

2. UMA BREVE RESENHA HISTÓRICA

É universalmente aceite que o final de 1951 e o início de 1952 se podem considerar como o “ano” zero da moderna química organometálica dos metais de transição, em geral, e da química dos metalocenos, em particular. De facto, em 1951, T.J. Kealy e P.Pauson [1] publicaram na *Nature* um artigo em que descreviam a reação de FeCl_3 com o reagente de Grignard $\text{MgC}_5\text{H}_5\text{X}$ em que, em vez do produto pretendido, o fulvaleno

obtinham um outro composto de estequiometria $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, muito estável, que formava belos **CRISTAIS LARANJA**. Num artigo publicado no *Journal of Chemical Society* em 1952 (mas submetido em 1951), S.A. Miller e colaboradores [2] descrevem que ao fazer reagir Fe^0 (pó) com dicitopentadieno (com o mesmo objectivo do grupo anterior) obtêm também **CRISTAIS LARANJA** com a estequiometria $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$.

Esta descoberta ocasional (serendipidade) de um composto fora do comum pôs imediatamente o problema de propor para ele uma estrutura, isto é, como seria a ligação química? As estruturas propostas pelos dois grupos referidos eram as seguintes:

Esta história tem o seu desenvolvimento seguinte em 1951/52 no Departamento de Química da Universidade de Harvard, USA, onde o jovem químico inglês Geoffrey Wilkinson tinha sido recentemente recrutado para ensinar química nuclear, a sua especialidade. No entanto, devido a mudanças de planos, foi-lhe atribuído essencialmente o ensino da química inorgânica, tarefa para a qual se preparou lendo e estudando os livros relevantes (que na altura não eram muitos), com destaque para a, então, bíblia da Química Inorgânica, *The Chemical Elements and their Compounds*, de N.V. Sidgwick, recentemente publicada e *The Nature of Chemical Bond* de Linus Pauling (1939), entre outros.

Em finais de 1951, Bob Woodward [3], Professor de Química Orgânica também em Harvard, chamou a atenção de Geoff Wilkinson para o título de um artigo a ser publicado no *Journal of Chemical Society* [2] sobre o “Dicitopentadienilo de ferro”. Tendo trabalhado bastante com o dicitopentadieno, a curiosidade de Woodward sobre este artigo era muita. Em Janeiro de 1952, Geoff Wilkinson vê na *Nature* o artigo de Kealy e Pauson [1]. Dado que toda a literatura publicada indicava que os alquilos e fenilos metálicos eram instáveis, a reação imediata de Wilkinson foi: “**Jesus Christ! It can't be that!**”

Quem conheceu o meu avô científico, Geoff Wilkinson, e a sua voz fanhosa, pode imaginar quão deliciosa teria sido aquela exclamação, se ele a tivesse pronunciado em voz alta.

Dada a ideia que já tinha formulado de que os complexos metálicos com o ligando butadieno deveriam ser quelatos *cis* a primeira estrutura que imagina é a seguinte:

No entanto, rapidamente se lembra do que aprendeu nos livros atrás referidos. Na página 84 do Sidgwick, este descreve o ião ciclopentadienilo da seguinte forma: “*Temos uma estrutura que é semelhante à molécula neutra de benzeno; uma molécula perfeitamente simétrica com cinco grupos CH dispostos de forma semelhante e ao mesmo tempo mais seis electrões de valência para além dos necessários para manter as ligações simples na molécula*”.

Lembrando-se também das estruturas de ressonância de Pauling, que tornam todos os átomos de carbono equivalentes, a conclusão veio imediatamente a seguir: “**It’s a sandwich**”

Bob Woodward, que também tinha visto a nota na *Nature*, chega à mesma conclusão de Wilkinson e em breve começam a colaborar; Woodward mais interessado na química orgânica do anel aromático e Wilkinson mais interessado em preparar análogos com outros metais. Após poucas semanas surge a primeira nota para o *Journal of American Chemical Society* [4], à qual em breve outras se seguiram. Entretanto, Mark Whiting, um pós-doc de Woodward, tinha cunhado para o composto $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ o nome de **FERROCENO**, por analogia com o benzeno. Ao mesmo tempo que a investigação descrita decorria em Harvard, do outro lado do Atlântico, na Technische Hochschule de Munique, E.O. Fisher tinha chegado às mesmas conclusões sobre o ferroceno [5]. Pelo seu trabalho pioneiro na química dos compostos sandwich, Geoffrey Wilkinson e Ernst Otto Fisher foram galardoados com o prémio Nobel da Química em 1973.

Ernst Otto Fischer

Geoffrey Wilkinson

Recomendo vivamente a leitura do artigo de Geoff Wilkinson sobre os primeiros quatro meses do frenesim em Harvard [6].

A ligação química nos metallocenos é, à luz da estrutura proposta e confirmada, bem compreendida. Qualquer aluno dos primeiros anos de um curso de Química não terá hoje em dia muita dificuldade em identificar as combinações de orbitais permitidas por simetria e, a partir daí, construir o respectivo diagrama de orbitais moleculares para o ferroceno. Para uma discussão recente ver o artigo de J.C.Green [7].

Para além do ferroceno, estão bem caracterizados como verdadeiros compostos sandwich neutros com ligandos ciclopentadienilos os seguintes:

$(C_5H_5)_2V$, Púrpura	$(C_5H_5)_2Cr$, Escarlate	$(C_5H_5)_2Mn$, (iónico)	$(C_5H_5)_2Co$, Púrpura	$(C_5H_5)_2Ni$, Verde
$(C_5H_5)_2Ru$, Branco	$(C_5H_5)_2Os$, Branco			

São conhecidas outras espécies com a mesma estequiometria $(C_5H_5)_2M$ mas que, ou são diméricas envolvendo pontes de H (além de outros tipos estruturais), como por exemplo, para $M = Ti, Zr, Nb$ e Ta , ou só existem como intermediários reactivos, mais ou menos bem caracterizados, como é o caso de $M = Mo, W, Rh, Ir, Pd$.

Embora relativamente raros existem também alguns compostos "sandwich dupla", como, por exemplo:

METALOCENOS DOBRADOS

Os primeiros metalocenos dobrados foram descritos em 1953 pela equipa de Harvard:

Em 1954 foram também descritos por Wilkinson e Birmingham [9] os metalocenos dobrados $(C_5H_5)_2TiCl_2$ **vermelho vivo**, $(C_5H_5)_2TiF_2$ **amarelo pálido**, $(C_5H_5)_2TiI_2$ **púrpura**, $(C_5H_5)_2VCl_2$ **verde pálido**, $(C_5H_5)_2NbBr_3$ **castanho avermelhado**.

Tendo em vista obter compostos sandwich análogos ao ferroceno para os metais Re, Mo, W e Ta , Wilkinson, primeiro ainda em Harvard e depois já em Londres, no Imperial College of Science and Technology, fez reagir ciclopentadieneto de sódio com os respectivos cloretos metálicos em tetrahidrofurano. Em todos os casos o produto obtido não é um análogo do ferroceno, mas sim um hidreto do metaloceno dobrado.

O rendimento das reacções é baixo, mas melhora significativamente se à mistura reaccional for adicionado borohidreto de sódio como fonte conveniente de hidreto [10].

A opção entre uma geometria sandwich ou sandwich dobrada depende fundamentalmente da configuração electrónica do metal.

Em 1976 Hoffman [11] publicou um estudo, por teoria de orbitais moleculares, da ligação química nos metalocenos dobrados, em que identificou as orbitais de fronteira, isto é, as orbitais que, num composto $(C_5H_5)_2ML_n$, o metal pode usar para estabelecer as ligações com os ligandos L.

Assim, por exemplo, num monohidreto será usada a orbital $4a_1$, num dihidreto as orbitais $2b_1$ e $4a_1$ e num trihidreto as orbitais $3a_1$, $2b_1$ e $4a_1$ [7].

Foram sintetizados, até hoje, certamente muito mais do que um milhar de metalocenos dobrados com uma grande variedade de metais e especialmente, de ligandos. Acresce que, em muitos deles, em vez do ligando C_5H_5 (normalmente representado por Cp), é usado um ligando em que um ou mais átomos de hidrogénio do anel estão substituídos por outro grupo, em geral um grupo alquilo, sendo de destacar, pelo seu uso intensivo, o pentametilciclopentadienilo, $C_5(CH_3)_5$, (Cp^*). Mais recentemente têm merecido bastante atenção a síntese e a química dos chamados metalocenos *ansa* [12] em que os dois anéis estão ligados por um grupo em ponte.

A razão para o interesse continuado na química dos metalocenos dobrados tem sido precisamente a sua grande quantidade e variedade, o que tem permitido muitos estudos de reactividade e de outras propriedades químicas e físicas. Por outro lado, muitos dicloretos de metalocenos de Ti, V, Nb e Mo provocam gigantismo celular, inibindo a síntese do DNA, o que os torna activos contra tumores; o complexo $(C_5H_5)_2TiCl_2$ é uma das espécies mais activas, estando actualmente em curso o desenvolvimento da sua aplicação clínica [13].

Também recentemente os metallocenos *ansa* de metais do grupo 4, vieram revolucionar a catálise de polimerização de Ziegler-Natta, devido a provocarem polimerização muito rápida, estereoselectiva para muitos monómeros e pesos moleculares muito elevados. O interesse industrial é enorme e a despesa em investigação e desenvolvimento de processos industriais que usem este tipo de catalisadores ascende já a muitos biliões de dólares! [14]

Em conclusão, desde a descoberta accidental (serendipida-de) do ferroceno em 1951, a química dos metallocenos não parou de crescer e com desenvolvimentos recentes de grande importância.

3. ALGUMA QUÍMICA DOS DITIOLATOS $(C_5H_5)_2M(SR)_2$ COMO “LIGANDOS ORGANOMETÁLICOS”

Tinha previsto que este capítulo seria um dos pratos fortes da minha Lição Ferreira da Silva. No entanto, a composição da audiência, em que predominam os colegas do ensino secundário, levou-me a privilegiar a parte introdutória, que, aliás, considero muito interessante, deixando-me pouco tempo para a descrição dos resultados científicos do meu grupo. Creio que a decisão foi acertada. Ao escrever este artigo para o Boletim da SPQ, deparei-me com o mesmo problema: a natureza do Boletim e o espaço disponível levam-me a tomar o mesmo tipo de opção. Daí que será um pouco telegraficamente que irei apresentar algumas moléculas interessantes.

Os derivados ditiolatos dos metallocenos dobrados são conhecidos desde o início dos anos 60.

A sua capacidade para actuar como ligandos em complexos de outros metais (M') foi rapidamente descoberta e muitos compostos polinucleares foram sintetizados com a seguinte estequiometria geral: $[\{ MCp_2(\mu-SR)_2 \} a (M'L_b)^d]$, $a = 1$ a 4 , $b = 0$ a 3 , $c = 1$ a 4 , $d = -1$ a $+3$

Alguns exemplos “clássicos”:

Alguns exemplos recentes:

a. Reacção com o tricloreto de índio

Vários produtos de acordo com o substituinte R e com as condições experimentais de recristalização

a. R = Ph

b. R = CH₃, C₂H₅ ou n-C₁₄H₂₉, com o contra-íão PF₆

c. R = Et, contra-íão BPh₄⁻

SCHARAL

M. José Villa de Brito *et al*,
J. Organometal, Chem., 1994, **466**, 159

Em todos os exemplos apresentados até agora [MCp₂(SR)₂] é um ligando “bem comportado”, actuando como ligando bidentado através de um par electrónico não partilhado de cada um dos átomos de enxofre

b. Reacções com complexos de Cu (I) e Cu (II)

Obtêm-se vários complexos dependendo do composto de cobre de partida e das condições reaccionais. Mostramos apenas um exemplo:

(M. José Villa de Brito, *resultados não publicados*)

É interessante detectar aqui um comportamento ainda mais ou menos “honesto” do nosso ligando. Isto é: há dois áto-

mos de enxofre que só usam um dos seus pares não partilhados, tal como nos exemplos anteriores, mas há dois átomos de enxofre que usam os seus dois pares não partilhados.

c. Reacção com o decacarbonilodirénio

Não se obtém o composto expectável com base num comportamento “honesto” do ditiolato:

M. José Villa de Brito *et al*,
J. Organometal, Chem., 1993, **453**, 23

Na realidade, da reacção resultam vários produtos, dos quais dois foram completamente caracterizados e, para lhes dar origem, o ligando organometálico teve um comportamento mesmo “desonesto”.

O primeiro é o seguinte complexo dinuclear, em que dois anéis Cp dão origem a um fulvaleno

O segundo é um cubano M_4S_4

d. Reacção com o decacarbonilodimanganês

Aqui obtemos novamente um cubano, mas com um vértice “metálico” vazio, que tanto quanto sabemos, é o primeiro exemplo deste tipo de estrutura com pontes de tiolato

(M. José Villa de Brito *et al*, resultados não publicados)

À laia de conclusão: fazer química organometálica é muito curtido e é importante. Devemos estimular mais jovens para trabalharem nesta área.

Aproveito para agradecer aos muitos dos meus colaboradores que tornaram esta lição Ferreira da Silva possível.

* versão adaptada da lição Ferreira da Silva, 1998

BIBLIOGRAFIA E NOTAS

1. T.J. Reilly and P.Pauson, *Nature*, 1951, **168**, 1039.

2. S.A.Miller, J.A.Tebboth and J.F. Tremaine, *J.Chem.Soc.*, 1952, 632.

3. Robert Burns Woodward (1917-1979), o mais importante químico orgânico do século vinte, recebeu o Prémio Nobel em Estocolmo em 1965. Ele marcou a sessão, não com uma descrição do trabalho já publicado, mas sim com o anúncio de um novo resultado em que tinha estado a trabalhar intensamente par aquela ocasião: a síntese total de um antibiótico da cefalosporina. Mesmo perante as hostes dos augustos laureados Nobel, Woodward demonstrou um génio raro e, de facto, a atribuição do Prémio Nobel precedeu as suas maiores realizações.

Esta nota foi extraída do livro *Nobel Laureates in Chemistry 1901-1992*, editado por Laylin K.James e publicada em 1993 pela *American Chemical Society* e pela *Chemical Heritage Foundation*, obra de referência que vivamente recomendo.

4. G.Wilkinson, M.Rosenblum, M.C.Whitig and R.B.Woodward, *J.Am.Chem.Soc.*, 1952, **74**, 2125.

5. E.O.Fisher and W.Pfab, *Zeitschrift fur Naturforschung B*, 1952, **7**, 377.

6. "The Iron Sandwich. A Recollection of the first Four Months." Geoffrey Wilkinson, *J.Organometal.Chem.*, 1975, **100**, 273.

7. J.C.Green, *Chemical Society Reviews*, 1998, **27**, 263.

8. G. Wilkinson, P.L.Pauson, J.M.Birmingham, F.A.Cotton, *J.Amer.Chem.Soc.*, 1953,**75**, 1953.

9. G.Wilkinson and J.M.Birmingham, *J.Amer. Chem.Soc.*, 1954, **76**, 4281.

10. M.L.H.Green, J.A.McCleverty, L.Pratt and G.Wilkinson, *J.Chem.Soc.*, 1961, 4854 e referências aí citadas.

11. J.W.Lauber and R.Hoffman, *J.Amer.Chem. Soc.*, 1976, **98**, 1729.

12. Do latim *ansa* – asa: parte curva em arco por onde se pega num vaso ou num cesto. A expressão metalloceno *ansa* foi cunhada pelo químico americano H. H. Brintzinger, um pioneiro neste tipo de compostos.

13. P.Kopt-Mayer, in "Complexes in Cancer Chemotherapy", ed. B.K.Keppler, Nova Iorque (1993), pp 259-296.

14. Ver, p.e. *Chemical and Engineering News*, 1995, **11**, 15.

Corantes, pigmentos e tintas

PIERRE LASZLO

Laboratoire de Chimie Fine aux Interfaces, Université de Liège, Bélgica
e Département de Chimie, École Polytechnique, Palaiseau, França

Neste capítulo é abordada, em primeiro lugar, a relação entre Ciência e Arte, especialmente entre a Química e a Pintura. Uma vez que a relação entre a Química e a Arte é muito antiga, remontando, não a alguns séculos mas a alguns milénios, começa-se por referir a dimensão histórica. Depois examina-se como é que o que fazemos como químicos e o como fazemos como químicos explica a contribuição da Química para a Arte. Em segundo lugar é passada em revista a utilização de dez pigmentos diferentes, principalmente pigmentos antigos. Por fim, examina-se como é que um laboratório em geral, e um laboratório de química em particular, pode contribuir para a Arte e para a conservação da Arte e do património artístico, o que levanta questões que são tratadas à medida que aparecem.

RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E ARTE

Se se reparar na datação dos achados arqueológicos, verifica-se que as pinturas são extremamente antigas; as primeiras pinturas, as “primeiras galerias de arte” datam de há 30 mil anos, que é a datação para a gruta de Chauvet, em França (Figura 1).

Fig. 1 - Gruta de Chauvet

Pierre Laszlo nasceu em Alger, em 1938. Fez os seus estudos secundários em Grenoble e no Rio de Janeiro, frequentou a Escola Normal Superior de Paris, e doutorou-se em Química na Sorbonne (1965), sob a orientação do Professor Edgar Lederer. Em 1962-63 foi *Research Associate* em Princeton, onde trabalhou com o Professor Paul von R. Schleyer. Foi nomeado professor de Química (Orgânica) na Universidade de Liège, em 1970, e na Escola Politécnica de Paris, em 1986, onde dirige o laboratório de química fina. É

professor convidado em muitas instituições, entre as quais se destacam as Universidades de Chicago, Cornell, Berkeley e Colorado (EUA) e Lausanne (Suíça), e o Instituto de Ciência Molecular de Okazaki (Japão). Foi distinguido com a Medalha Randolph T Major da Universidade de Connecticut e prémios da Academia de Ciências de França e da Sociedade de Química Belga. É autor de mais de uma dezena de livros e de mais de duas centenas de artigos originais. As temáticas de investigação de Pierre Laszlo situam-se no âmbito da Química Orgânica: síntese, química biomimética e química prebiótica; uma química doce, que respeita o ambiente natural. Foi-lhe atribuído, muito recentemente, o prémio Maurice Pelouse 1999 (Fundação de França) pelo conjunto da sua obra de vulgarização.

Aqueles que se interessam por pintura pré-histórica gostarão de saber que no centro-sul de França, em Pech-Merle, há uma gruta que alberga um dos mais belos conjuntos de pinturas e que é provavelmente tão bela como Lascaux — Lascaux foi encerrada por um período que durará alguns anos. Na gruta de Pech-Merle, um dos mais belos frescos de cavalos tem cerca de 24 mil anos. Portanto, sem dúvida os químicos têm sido artistas desde há muito tempo. Àqueles que estiverem interessados nas relações entre a Química e a Arqueologia recomenda-se um livro maravilhoso sobre arqueologia, intitulado “*Traces of the Past*”, editado por Addison-Wesley em 1997 (este livro é da autoria dum nosso colega dos EUA, Joseph Lambert, um excelente cientista do Departamento de Química da Northwestern University). Há evidência de que as cerâmicas têm cerca de 11 milénios e de que os esmaltes têm cerca de 6000 anos, tal como a metalurgia. Os corantes — e os mordentes que permitem que eles adiram — datam de há aproximadamente 2 milénios a.C., tal como os vidros. Os corantes orgânicos começaram a ser usados cerca de 12 mil anos a.C. e os cristais de chumbo surgiram cerca de 600 anos a.C.

No que diz respeito aos corantes orgânicos, a **púrpura**, extraída dos caracóis múrces, abundantes nas águas do Mediterrâneo, foi usada na antiguidade, especialmente para fins rituais, religiosos e afins. O **carmim** (o “*kermès*”) extraído de alguns insectos com o mesmo nome foi pela primeira vez isolado pelos árabes. O seu nome foi usado para alguns corantes que ainda são utilizados. O **índigo** era obtido, nesta parte do mundo, a partir da planta de Vaud (*Indigofera* L.). As plantas de índigo são endémicas na Ásia e foram importadas muito cedo. Contudo, logo que as Américas foram descobertas, o chamado pau-de-campeche começou a ser usado para várias aplicações de tingimento.

O caracol múrcice conduz-nos ao capítulo da autoria de Clementina Teixeira. Sendo um dever dos químicos colaborar com os professores do ensino secundário, há aqui também lugar para colaborarem com os artistas, porque os artistas andam precisamente à procura de tecnologias inovativas do tipo da que Clementina Teixeira desenvolve. Assim, se se fornecer aos artistas tecnologias que sejam relativamente simples de implementar, como é o caso do crescimento destes cristais e dos cristais que podem ser corados, então estar-se-á a fazer um bom trabalho. É de referir o excelente trabalho estético e científico desenvolvido pela equipa do Dr. Bart E. Kahr, do Departamento de Química da Universidade de Washington, em Seattle, no tingimento de cristais em planos reticulares específicos; estes são sistemas também extremamente interessantes no contexto que lhes é próprio.

A cor era, com certeza, muito importante para os alquimistas. No que se refere aos cristais de chumbo, é de salientar, em

primeiro lugar, o **cinábrio**, que é o nome dum dos vermelhões. O cinábrio é mencionado em alguns dos livros mais antigos de alquimia da China. Ko Hong, por exemplo, esteve activo entre 283 e 343, quer dizer, no período negro da nossa Idade Média, quando a Europa era devastada pela peste. Ko Hong escreveu um tratado de alquimia onde refere duas substâncias — o ouro e o cinábrio — como as mais eficazes em termos de assegurarem uma longa vida, de assegurarem a imortalidade. Pelo menos no que diz respeito ao cinábrio, não podia ter sido muito eficaz, visto que o cinábrio é o sulfureto de mercúrio, que, obviamente, é muito tóxico.

O **zarcão** é também um derivado dum metal pesado, o chumbo, como o vermelho de chumbo, minio, de composição Pb_3O_4 .

O **ouripimento** é outro pigmento que é mencionado frequentemente nos livros antigos de química, um sulfureto de arsénio tal como o As_2S_3 .

Os **vitriolos** eram sulfatos de vários metais, a maior parte das vezes de cobre e de ferro. O próprio nome vitriolo também era um acrónimo dum poema latino que convidava o alquimista a visitar o interior da Terra. Por exemplo, quando na Flauta Mágica Mozart avança para a cerimónia da iniciação, toda a representação é feita a partir da palavra vitriolo.

O **branco de Veneza**, que será novamente referido mais abaixo, era uma mistura de sulfato de bário com branco de chumbo, ou seja carbonato de chumbo, um pigmento usado desde os tempos mais antigos.

Avancemos agora para o século XIX, para referir a sua contribuição para este tema, nomeadamente com os pigmentos. Jean Antoine Chaptal, Jean-Baptiste Dumas, Louis Jacques Thenard, Michel Eugène Chevreul, William Henry Perkin, Louis Pasteur e Paul Ehrlich são alguns cientistas do século XIX que deram contribuições relevantes para a química da cor. Começaremos pelos últimos três, Perkin, Pasteur e Ehrlich, que materializam uma conjugação fascinante entre cor, Química Biológica e Medicina. Em 1854, com apenas 19 anos de idade, William Henry Perkin decidiu fazer quinino. Para isso, planeou uma síntese baseada na composição deste fármaco contra a malária. Perkin ficou espantado com o resultado, quando no recipiente de reacção obteve uns lindos cristais púrpura a que chamou **malveína**. Perkin conseguiu convencer o pai e o irmão mais velho a montar uma fábrica para a produção industrial deste corante. Felizmente para a família Perkin, a rainha Vitória gostou desta cor, o que fez com que se tornasse moda. Foi assim que teve início a moderna indústria de tingimento que, naturalmente, na última metade do século XIX teve um crescimento muito rápido, especialmente na Alemanha.

Na Alemanha, no fim do século passado e princípio do século XX, Paul Ehrlich era um microbiologista perito na utilização de corantes, isto é, na utilização das cores para tingir selectivamente as suas lâminas de patologia. Na viragem do século teve a seguinte ideia: se os corantes podiam tingir selectivamente certas partes de um espécime, talvez pudessem também constituir aquilo a que chamou a “bala mágica”, isto é, que pudessem tratar doenças específicas. Nessa altura, a Alemanha era um império colonial com colónias em África. Assim, Ehrlich atacou primeiro algumas doenças tropicais, começando pelo Tripanosoma, ou seja, o agente infeccioso da doença do sono na África negra. Este foi o primeiro sucesso da quimioterapia, por volta de 1905. Prosseguindo nesta linha, por volta de 1915 Ehrlich veio a inventar o Salvarsan, a primeira droga activa contra a sífilis.

Voltemos agora ao princípio do século XIX, com o químico francês Jean Antoine Chaptal, conde de Chanteloup. Na sua obra “*Éléments de Chimie*”, publicada em 1803, pode ler-se: “Le préjugé qui règne en despote dans les ateliers de peinture, en écarte le chimiste comme un inovateur dangereux et le proverbe si accrédité que *expérience passe science*, contribue encore à écarter la lumière des ateliers”. Quer dizer que nessa época, isto é, no princípio do século XIX, havia uma fricção, que ainda subsiste nos nossos dias, entre o artesão, que tem a experiência, e o cientista, que tem o conhecimento. E Chaptal continua, explicando a sua teoria da cor ligada à calcinação de metais. Com efeito, tendo notado que certos óxidos metálicos mudam de cor com a temperatura, inventou uma teoria para as cores dos vários pigmentos que eram conhecidos na época. Esta teoria era obviamente baseada na teoria da acidez de Lavoisier, ligando a cor ao conteúdo do material em oxigénio.

Segue-se um excerto do livro de Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) intitulado “*Traité de Chimie appliquée aux Arts*” — Dumas era também professor da “*École Polytechnique*”. “Il réserve toute son attention pour les phénomènes de contact qui déterminent la réunion ou la séparation de molécules différentes par la nature”. E um pouco mais à frente: “Nous sommes environnés d’une foule de matières variées qui sans cesse se combinent, se désunissent de manière à produire des modifications infinies en apparence”. Pode definir-se a Química como uma arte combinatória de dissociar e recombinar, que os alquimistas já tinham estabelecido, podendo deste modo produzir-se um número infinito de substâncias diferentes, o que é importante.

Louis Jacques Thenard ficou conhecido para a posteridade talvez mais como um vilão; com efeito, por não o suportar, Victor Hugo chamou Thenardier à família particularmente odiosa dos “*Misérables*”: Cosette sofre muito às mãos de Thenardier. Não sendo só um bom químico, Thenard veio a tornar-se também Ministro do Interior de Napoleão; com tais poderes políticos, atraiu, naturalmente, muitas críticas. Thenard, como veremos, foi o inventor dum azul que descreve em 1866 no seu “*Traité de Chimie Élémentaire*” nos seguintes termos: “L’oxyde et l’arséniate de cobalt que l’on emploie pour colorir en bleu les porcelaines, le verre, faire le bleu d’azur et le bleu de cobalt proprement dit”.

Debruçar-nos-emos agora mais demoradamente sobre Chevreul porque a sua contribuição para a química da cor foi enorme. Michel Eugène Chevreul viveu uma longa vida (1786-1889) e fez toda a sua carreira no “*Muséum National d’Histoire Naturelle*”, inicialmente como assistente e, a partir de 1830, como professor; em 1864 tornou-se director. É muito conhecido no mundo dos livros de química pela sua contribuição para a química das gorduras. Isolou os ácidos oleico, palmítico e esteárico e em 1825 patenteou um processo melhorado para fazer velas, que ainda hoje é usado. Contudo, um outro ponto importante foi a sua nomeação, em 1824, para a “*Manufacture Nationale des Gobelins*”, ou seja, o lugar em França onde é realizada tecelagem sofisticada. Estudou, então, muito seriamente, as razões científicas para os corantes se fixarem aos tecidos e, ao fazer tal, desenvolveu uma teoria das cores, que é uma extensão da que o escritor Goethe tinha construído alguns anos antes. Esta teoria, a que Chevreul chamou do contraste simultâneo das cores, foi esquecida durante algum tempo. É interessante notar que ele nasceu em 1786 e morreu em 1889. Em 1886, fez 100 anos e, para celebrar este acontecimento, o Governo Francês subsidiou a publicação das suas obras completas. Foi então que

os pintores se consciencializaram, pela primeira vez, desta lei do contraste simultâneo, pelo que os grandes pintores, quer no fim do século XIX, quer no século XX, aplicaram directamente a teoria de Chevreul. Foi o caso de Georges Seurat (1859-1891) cujo quadro “Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte” (Figura 2), que está no Art Institute de Chicago, é uma aplicação directa das teorias de Chevreul.

Fig. 2 - Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte.

Mais tarde, Robert Delaunay (1885-1941) e a sua mulher Sonia Delaunay (1885-1974) também aplicaram as teorias da cor de Chevreul. É difícil resistir a contar um episódio anedótico a propósito do centenário de Chevreul. Os jornalistas chegam à sua porta, tocam a campainha e este velhotinho todo alquebrado, a sua cabeça coberta de cabelo branco, abre a porta e um jornalista exclama “Senhor Thenard, muitos parabéns pelos seus cem anos!”. O velhotinho diz: “Espere um momento, por favor” e grita “Papá, papá, estão aqui uns senhores que te querem ver”. Tendo vivido até a uma idade tão avançada, também publicou um estudo científico sobre Gerontologia.

Voltemos agora à citação de Dumas que foi reproduzida acima. A ciência química consiste em dissociar (análise) e em recombinar (síntese) e, portanto, é uma arte combinatória. Dumas deu-lhe um importante contributo, ao mesmo tempo que Justus Liebig (1803-1873) e também Auguste Laurent (1807-1853), ao mostrar que os módulos importantes em química não são os compostos isolados mas sim segmentos imaginários – os radicais. E, assim, a Química torna-se naquilo que Karl Popper apelidou de “World III”, ou seja, entre o espírito e a matéria. Não é exclusivamente no sentido da matéria, mas mais no sentido de espírito do que no da matéria, e é uma ciência hiper-racional, extremamente lógica. Temos, no entanto, um ponto de convergência entre a Química e a Arte, que é a singularidade duma molécula e a singularidade duma obra de arte.

DEZ PIGMENTOS

Daqui em diante vamos essencialmente apresentar dez pigmentos. Primeiro, o **verde esmeralda**, a que os franceses chamam “vert véronèse”. É um acetoarseniato de cobre que foi produzido pela primeira vez por Russ e Sattler, em 1814, na cidade de Schweinfurt, na Alemanha. Pouco depois, Liebig na Alemanha e,

independentemente, Braconnot em França introduziram um processo industrial para produzir este verde particular, que foi intensivamente usado pelos artistas até muito recentemente, isto é, até aos anos 60 deste século, quando começou gradualmente a ser abandonado por ser muito tóxico. Um dos problemas práticos é que este verde escurece, perde a cor, em resposta à presença de sulfatos na atmosfera. Isto é exemplificado por uma série de aguarelas de Paul Cézanne (1839-1906) guardadas no Art Museum em Filadélfia, cujos verdes ficaram castanhos. É apropriado levantar aqui a seguinte questão: dever-se-ia restaurar essas aguarelas de modo a recuperarem o seu aspecto original ou dever-se-ia, pelo contrário, mantê-las tal como ficaram, isto é, como os olhos de Cézanne nunca as viram (porque, evidentemente, as transformações químicas que tornaram aqueles verdes castanhos não podiam ter sido previstas por Cézanne)? E aqui temos um conflito, em que os cientistas não deverão envolver-se como protagonistas, entre aqueles que consideram as obras de arte como investimentos e os que as consideram como uma criação do espírito e, portanto, preciosas pelo que nos dizem acerca da fonte da criatividade (neste caso da de Paul Cézanne). Actualmente, através da digitalização destas pinturas, dispõe-se duma tecnologia que permite recriar nos nossos ecrãs de computador as aguarelas originais tais como foram vistas por Paul Cézanne e esta é, provavelmente, a via a seguir, devendo dissociar-se, pelo menos um pouco, o julgamento do valor da qualidade estética do julgamento do valor acerca do preço da obra de arte. Assim, as aguarelas originais foram-se, mas é possível reconstruí-las por forma a ficarem tal como eram quando foram pintadas por Cézanne, e isto é que é importante.

É agora a vez da **viridiana**, um pigmento verde que foi muito usado. A viridiana foi descoberta por Pannetier e industrializada por Guignet. É uma constatação recorrente que, durante os anos 70 do século passado, entre os vários pintores impressionistas que usaram este pigmento, Claude Monet (1840-1926) foi forçado a abandoná-lo, simplesmente porque era muito caro e as suas posses não lhe permitiam continuar a usá-lo. É interessante ler algumas notas e cartas em que Claude Monet pedia ao seu agente que lhe emprestasse algum dinheiro, que lhe comprasse alguns quadros. Face ao preço que os seus quadros atingiram nos nossos dias, é trágico e horrível constatar-se que Claude Monet não pudesse permitir-se usar viridiana em vez do verde esmeralda.

Durante muitos séculos o azul como pigmento só muito raramente era usado em pintura. Por exemplo, nos manuscritos com iluminuras das bibliotecas monásticas da Idade Média (Figura 3), a cor azul era feita de lápis-lazúli partido em pequenos pedaços e posto num pouco de óleo – e era muito caro, por-

Fig. 3 - Iluminura

que vinha, para todo o mundo, de uma única fonte, o Afeganistão. Portanto, só as partes da pintura que mostravam imagens de maior prestígio, tais como o Santo Padroeiro, tinham direito a um pigmento tão caro.

Era tal a necessidade dum pigmento azul, que quando J.B. Guimet, em 1828, sintetizou o **azul-ultramarino**, que é o aluminosilicato de sódio, o Governo Francês deu-lhe um prémio pecuniário de elevado montante, uma vez que a sua invenção vinha preencher uma grande necessidade. E este azul ultramarino foi usado, por exemplo, no quadro de Renoir “La première sortie” (Figura 4), que foi pintado em 1875-1876. Como resultado da publicidade conferida pelo prémio concedido pelo Governo, o azul-ultramarino passou a ser produzido industrialmente em França a partir de 1828.

Fig. 4 - Renoir, La première sortie

O **azul-cobalto**, que foi descoberto, ou redescoberto, por Thenard em 1808, foi, por exemplo, usado no quadro “La Grenouillère”, de Monet, para pintar o azul da água (Figura 5).

Outro pigmento azul é o **azul-da-Prússia**, que é o $\text{Fe}^{3+}(\text{NH}_4)\text{Fe}^{2+}(\text{CN})_6$ e foi inventado por volta de 1700; Monet também foi forçado a abandoná-lo durante a década de 1870. A propósito deste pigmento, é oportuno referir Constantin Guys, um artista francês da segunda metade do século XIX. Guys foi um artista documentarista que era muito rápido a fazer um esboço e usava predominantemente o azul-da-Prússia nos seus trabalhos. Muitos dos semanários da época – que corresponde-

Fig. 5 - Claude Monet, La Grenouillère

riam às populares revistas dos nossos dias profusamente ilustradas com vistosas fotografias das grandes figuras, dos poderosos, de príncipes, de artistas de cinema, etc. – incluíam esboços, que eram desenhados com azul-da-Prússia, por Constantin Guys, também um grande e íntimo amigo do poeta Charles Baudelaire.

O **amarelo de crómio**, que é o cromato de chumbo, (PbCrO_4), era também conhecido dos alquimistas e foi descoberto, ou melhor, redescoberto, por volta de 1800. Dá um lindo verde quando combinado com o azul-da-Prússia. Encontrámo-lo novamente no quadro “La Grenouillère”, de Monet, mas os impressionistas abandonaram-no por volta de 1870. Uma das razões foi o seu escurecimento na presença de sulfuretos.

Um outro pigmento amarelo é o **amarelo de cádmio**, que é o sulfureto de cádmio, e foi introduzido em 1825. Monet usou-o muito. Tornou-se um substituto do amarelo de crómio, mas a sua toxicidade obrigou a que o abandonassem gradualmente.

Abordaremos a seguir os vermelhos e terminaremos depois com os brancos esta história de vários pigmentos.

Os encarnados são em larga medida os vermelhões ou **zarcões**, isto é, o sulfureto de mercúrio, mas também outros, tais como o sulfureto de antimónio. Por exemplo, no quadro “La Grenouillère”, de Claude Monet (Figura 5), nas flores vermelhas, na parte esquerda do quadro, foi usado este pigmento. Georges de La Tour (1593-1652) foi um pintor extraordinário acerca do qual muito pouco é conhecido; na sua obra prima “La Diseuse de Bonne Aventure” (Figura 6), usa o zarcão como primário, o que dá certos efeitos interessantes. Por exemplo, no braço do simplório é produzido um efeito óptico que dá a impressão de profundidade do tecido. No cinto, vermelho, da mesma personagem também se vê uma espécie de halo, um efeito muito bonito dado pela subcamada de zarcão.

Vamos referir apenas dois pigmentos brancos, começando pelo **branco de chumbo**. Este pigmento é o carbonato de chumbo e é, provavelmente, um dos mais antigos pigmentos conhecidos, encontrando-se nas pinturas rupestres em conjunto com outros pigmentos, tais como o óxido de manganês, MnO_2 , e o negro de fumo. Na Antiguidade, era conhecido dos egípcios, dos gregos e dos romanos, sendo às vezes combinado com

Fig. 6 - Georges de La Tour, La Diseuse de Bonne Aventure

o sulfato de bário, tal como no branco veneziano, em que o branco de chumbo é combinado em partes iguais com o sulfato de bário. Um trabalho realizado recentemente na América por Bernard Cash foi de grande utilidade porque agora, fazendo uma análise isotópica, pode-se dizer qual é a origem do branco de chumbo e também datá-lo. Como pigmento, tem a grande vantagem de ser lipofílico, e também a de ter uma boa plasticidade, propriedades muito relevantes para os pintores. A importância da lipofilia resulta de que em todas as pinturas a óleo é importante ter tintas tão homogêneas quanto possível. Claude Monet usou este pigmento branco, em particular na última fase da sua carreira.

Hoje em dia, a maior parte dos pigmentos brancos usados pelos pintores são de óxido de titânio. O TiO_2 existe sob duas formas diferentes conhecidas como o **anatásio** (ou octaedrite) e o **rútilo**. O anatásio começou a ser vendido pelos comerciantes parisienses Bourgeois, em 1925, e Lefranc, em 1927. Contudo, na década de 1950, Dupont de Nemours iniciou o fabrico de óxido de titânio a partir de tetracloreto de titânio, que é a forma em que o titânio que vem da República Popular do Congo é transformado a partir do minério. Este processo da Dupont de Nemours veio a tornar-se predominante no fim da década de 50, tanto na América como na Europa. O "Liquid Paper", que se tornou tão familiar, usa este óxido de titânio, do rútilo; tem a vantagem de ter um índice de refração muito elevado (2.6), que é responsável pela sua grande opacidade, e é por isso muito útil tanto para pintores como para burocratas.

CONTRIBUIÇÃO DO LABORATÓRIO PARA A ARTE

Este exemplo do óxido de titânio vai ser agora usado para passar à análise do papel do laboratório e do que ele pode contribuir para a compreensão das obras de arte.

O espectro Raman dos brancos dum quadro do Pablo Picasso pintado em 1956 e intitulado "La femme nue à chaise basculant" (Figura 7) mostra um conjunto de linhas espectrais em que se podem contar pelo menos cinco linhas em posições bem definidas. Deste modo, se se combinar o conhecimento da

posição destas linhas espectrais com o conhecimento da resolução da espectroscopia Raman, dá-se conta de que o espectro Raman é uma verdadeira impressão digital deste pigmento, uma vez que a probabilidade de encontrar aquele número de linhas nestas posições particulares é apenas de 1/1012. Portanto, isto é uma prova, sem qualquer ambiguidade, de que no caso particular deste quadro de Picasso se está em presença de anatásio. Mais à frente voltaremos a este ponto.

Uma outra utilização dum laboratório de química para compreender uma obra de arte é exemplificada a seguir. Por espectrofotometria de absorção atômica, a tinta azul duma pintura mostra conter ferro. Poder-se-á vir a concluir, no entanto, que esta porção azul deste caso particular é extremamente enganadora. Com efeito, se por fluorescência de raios-X, se vir que, na realidade, foi aplicada uma camada de azul-ultramarino na tela usada para o quadro, mas que por outro lado foi também aplicada uma camada de fundo em que foi utilizado um pigmento de terra ferruginosa e que era, assim, responsável pela presença de ferro, será então eliminada a hipótese do azul-da-Prússia.

Agora, outro exemplo, que é um pouco mais complexo. A espectroscopia de ressonância de spin electrónico (RSE), uma "irmã" da ressonância magnética nuclear, foi aplicada a peças

Fig. 7 - Pablo Picasso, La femme nue à chaise basculant

de cerâmica datadas de 9 séculos a.C. O que é observável são os chamados factores-g das camadas internas e externas dos fragmentos destas peças de cerâmica. Para fornecer um modelo para a camada interna, que tem uma cor vermelho-acastanhada, os autores deste trabalho, Gualtieri e Del Monaco, compararam os factores G com os de escórias vulcânicas. Concluíram que estas peças de cerâmica eram feitas num forno para cerâmica com uma técnica primitiva, que consistia em aquecimentos brutais e heterogêneos, e que não foi usado um forno de mufla, contemporâneo destas cerâmicas. O que se pretende agora inferir é que se deveriam aplicar argumentos científicos para cada uma destas 5 afirmações e evitar-se assim qualquer dogmatismo perigoso: 1) É importante dispor-se de métodos independentes da RSE para confirmar as asserções propostas. 2) No âmbito da RSE seria importante dispor-se doutros parâmetros característicos das paredes internas e externas destas peças de cerâmica. 3) É necessário questionar se os modelos das camadas internas e externas eram adequados e suficientes para permitir o exercício da crítica que é habitual no método científico. 4) A conclusão era a de que a técnica de fabrico era muito primitiva e, mais uma vez, é necessário ser-se cuidadoso quanto à história da Arte e à evidência obtida da aparelhagem científica. 5) O facto de os fornos de mufla não serem usados, apesar de já existirem, indica a necessidade de pesquisar documentos antigos para se obter informação que suporte solidamente a hipótese de estar envolvida uma questão de classe, isto é, a de que estas cerâmicas eram fabricadas para pessoas que não tinham meios ou não eram consideradas merecedoras de ser fabricadas nos fornos de mufla que apesar de tudo existiam. Isto é apenas um exemplo da gama de questões que se levantam.

Finalmente, outro ponto a aflorar é o de que não se deve imaginar mas, como é uso em Ciência, se deve ter uma atitude inovadora e experimentalista relativamente aos materiais e à Ciência de Materiais. E aqui voltamos ao exemplo referido a propósito do espectro Raman da “La femme nue à chaise basculant” de Pablo Picasso, lembrando que o branco veneziano consiste numa mistura de carbonato de chumbo e de sulfato de bário. Voltamos também ao caso da intervenção do laboratório no estudo científico do azul de pinturas, que mostra a prudência com que se devem avançar quaisquer asserções: a presença de ferro numa pintura azul poderia conduzir facilmente à conclusão errada de se tratar de azul da Prússia. Ora, no exemplo referido, o espectro de fluorescência X seria compatível apenas com uma camada de azul-ultramarino sobreposta a uma preparação da tela com uma terra contendo ferro.

CONCLUSÕES

Limitámo-nos aqui a alguns pontos, preferindo aprofundá-los um pouco de forma ilusoriamente exaustiva! Se a interacção da Arte e da Ciência e as suas tão impressionantes relações mútuas foram enfatizadas, foi sobretudo porque uma e outra são a glória do Homem!

BIBLIOGRAFIA DO AUTOR PUBLICADA EM PORTUGUÊS

Alguns dos seus livros encontram-se traduzidos em português:

- A Palavra das Coisas, Gradiva, 1995. (La Parole des Choses, Hermann, 1993).
- A Nova Química, Instituto Piaget, 1996. (La Chimie Nouvelle, Flammarion, 1995).
- O que é a Alquimia?, Terramar, 1997. (Qu'est-ce que l'Alchimie?, Hachette, 1996).
- Pequeno Tratado do Sal, Terramar, (em publicação). (Chemins et Savoirs du Sel, Hachette, 1998).

Porfirinas: da Natureza à Síntese e à Medicina

MARIA DA GRAÇA P. M. S. NEVES

Departamento de Química, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

Certas porfirinas e compostos afins estão a ser alvo de intensos estudos interdisciplinares que visam tornar possível a sua aplicação na melhoria das condições da vida humana. Esses compostos têm sido testados, por exemplo, como catalisadores em processos oxidativos, como potenciais agentes biocidas, como modelos biomiméticos de processos vitais e ainda na produção de novos materiais electrónicos. *A observação de que células neoplásicas retêm certas porfirinas em maior extensão do que as células normais, associada às propriedades fotossensibilizadoras que esses tipos de compostos apresentam, originou uma das suas aplicações mais promissoras, a terapia fotodinâmica do cancro (PDT).* Nesta comunicação apresenta-se a metodologia que o grupo de Química Orgânica da Universidade de Aveiro tem desenvolvido na síntese de potenciais fotossensibilizadores porfirínicos, para serem posteriormente testados em PDT, e os resultados de estudos já realizados *in vivo*.

Na natureza, os pigmentos responsáveis por funções vitais como por exemplo as de respiração, fotossíntese, crescimento e transferência electrónica, apresentam na sua constituição macrociclos do tipo porfirínico ou afim. A estrutura tetrapirrólica desse tipo de compostos foi estabelecida, de uma forma inequívoca, por Hans Fischer (Prémio Nobel, 1929), da Universidade de Munique, com a síntese do Heme, grupo prostético de várias hemoproteínas.

como modelos biomiméticos de processos vitais, [4] na produção de novos materiais electrónicos [5] e em medicina. [6] Neste último caso, várias têm sido as situações patológicas estudadas (ver Esquema 1), sendo a sua utilização na terapia fotodinâmica do cancro (PDT) uma das mais promissoras. Este tipo de tratamento pode-se considerar uma parte da fotoquimioterapia onde além de luz e do fármaco é necessário a presença de oxigénio.

leto. É esta espécie, altamente citóxica, que é considerada a grande responsável pela necrose do tumor. Os primeiros fotossensibilizadores porfirínicos a serem utilizados resultaram do tratamento da hematoporfirina com uma mistura de H_2SO_4 e ácido acético seguido de tratamento básico. A mistura complexa obtida, constituída por monómeros, dímeros e oligómeros com vários tipos de ligação, foi sujeita a purificação cromatográfica para remover parte da fracção monomérica (considerada com baixa actividade necrótica), dando origem a uma formulação conhecida por Photofrin®. Esta formulação encontra-se já aprovada para uso terapêutico em vários países da Europa (Portugal está à espera de autorização), Canadá, Estados Unidos e Japão, entre outros. No entanto, a Photofrin apresenta algumas desvantagens como seja o facto de se tratar de uma mistura, ser pouco selectiva para com o tecido tumoral e originar fotossensibilidade cutânea durante algumas semanas. Além disso, a banda de absorção do vermelho onde a droga é fotoactivada é fraca e não se encontra na região do espectro onde o tecido é transparente. Tais desvantagens têm levado a comunidade científica a investir um grande esforço na procura de novos fotossensibilizadores, nomeadamente através da síntese de novos derivados porfirínicos. Um bom fotossensibilizador deve combinar as seguintes características: apresentar elevada selectividade para o tecido neoplásico em relação ao tecido normal; não possuir toxicidade na ausência de luz; absorver eficazmente radiação a $\lambda > 650$ nm (radiação com maior poder de penetração nos tecidos); não sofrer degradação pela luz; apresentar rendimentos quânticos de estado tripleto e de formação de 1O_2 elevados; ser uma substância pura, de síntese curta e de rendimento elevado.

O grupo de Química Orgânica da Universidade de Aveiro tem desenvolvido esforços na síntese de macrociclos porfirínicos com potencialidades para serem utilizados em PDT.

Tendo em conta a maior actividade necrótica apresentada pelas fracções de maior peso molecular da Photofrin e que porfirinas com ligação amida apresenta-vam resultados bastante promissores em termos de PDT, em Aveiro foram sintetizados os seguintes dímeros:

R = D₁: m-OCH₃; D₂: H; D₃: p-OCH₃; D₄: m-OCH₃ (ver Gráfico 1)

Os resultados dos testes *in vivo* efectuados com estes dímeros serão apresentados adiante. [7]

Numa outra abordagem, tem-se estudado a síntese de novos compostos com características espectroscópicas consideradas convenientes para estudos de PDT, utilizando a reactividade de porfirinas viniladas *meso*-tetrassubstituídas em meio ácido e como dienos em reacções de Diels-Alder.⁸⁻¹¹

No Esquema 2 encontram-se as estruturas de alguns dos compostos sintetizados e os respectivos espectros de visível.

a) H, b) 1,4-naftoquinona, 2-H, c) 1-acetilenodiacetato de dimetilo, 2-H

Esquema 2

Estudos de PDT com fotossensibilizadores sintetizados em Aveiro

Estudos farmacocinéticos

Com os dímeros D1, D2, D3 e D4 foram realizados estudos de PDT que envolveram numa primeira fase estudos farmacocinéticos. Este tipo de estudos permite avaliar como é que ocorre a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção do fotossensibilizador e, conseqüentemente, tirar conclusões sobre a sua selectividade para o tecido tumoral, bem como o período óptimo para a realização da irradiação. Esse período geralmente coincide com a concentração máxima da droga no tecido maligno. No Esquema 3 encontram-se apresentadas as várias fases desses estudos tendo sido utilizados como modelo animal ratos fêmea Balb/c. A implantação do tumor (células de fibrossarcoma MS-2) foi realizada por via intramuscular na parte superior da perna direita do rato. Após 7 ou 8 dias, altura em que o tumor atingiu o diâmetro aproximado de 0,7 cm, procedeu-se à injeção do fotossensibilizador incorporado no veiculante DPPC (DL- α -dipalmitoil-fosfatidilcolina) por via intravenosa. Em intervalos de tempo pré-determinados, os animais foram sacrificados e procedeu-se à determinação da concentração do fotossensibilizador, no plasma sanguíneo (soro), no tumor e em alguns tecidos seleccionados (baço, cérebro, fígado, pele, pulmões, rins e músculo), por fluorescência.

Esquema 3

Na Tabela 1 são apresentados, a título de exemplo, os resultados obtidos para o dímero D1. Pode-se observar que a eliminação do fotossensibilizador do plasma sanguíneo é relativamente rápida e a baixa concentração detectada no tecido cerebral dá indicação para a inexistência de toxicidade ao nível do sistema nervoso central. As doses elevadas de porfirina recuperadas no baço e fígado, é uma situação característica dos fotossensibilizadores hidrófobos uma vez que estes são eliminados por via hepática. Merece uma atenção especial a análise dos resultados obtidos para o músculo (no caso estudado é o tecido peritumoral), e para a pele (dá informação sobre o efeito indesejado da fotossensibilidade cutânea). O Gráfico 1 permite comparar a quantidade dos vários fotossensibilizadores presente no músculo, tumor e na pele, a diferentes tempos após a injeção. Todos os dímeros apresentam a razão concentração tumor/músculo máxima ao fim de 24 h após injeção. Os valores encontrados para a razão entre a concentração dos vários fotossensibilizadores no tumor e no músculo e também no tumor e na pele estão apresentados na Tabela 2. Pode-se observar que o dímero D1 é o que apresenta maior afinidade para o tecido tumoral.

Tabela 1 – Quantidade de porfirina recuperada do soro sanguíneo e de certos tecidos de ratos fêmea Balb/c quando injectados por via intravenosa com uma dose de 1mg/kg do dímero D1 incorporado em DPPC

Tempo (h)	PULMÕES	FIGADO	BAÇO	RINS	MÚSCULO	PELE	TUMOR	CÉREBRO	SORO
1	1.0 ± 0.3	3.3 ± 0.3	1.8 ± 0.1	0.7 ± 0.1	0.1 ± 0.0	0.3 ± 0.0	1.1 ± 0.1	0.1 ± 0.0	6685.6 ± 357.7
3	0.7 ± 0.1	3.4 ± 0.3	2.9 ± 0.4	0.6 ± 0.2	0.1 ± 0.0	0.1 ± 0.0	1.4 ± 0.1	0.1 ± 0.0	5539.1 ± 667.8
6	0.4 ± 0.1	6.8 ± 0.8	3.7 ± 0.8	0.4 ± 0.1	0.1 ± 0.0	0.3 ± 0.2	2.0 ± 0.2	nd	2550.4 ± 392.0
15	0.2 ± 0.0	8.1 ± 0.5	5.2 ± 0.8	0.2 ± 0.1	nd	0.1 ± 0.0	1.9 ± 0.4	nd	115.3 ± 13.4
24	0.1 ± 0.0	9.5 ± 0.5	5.1 ± 0.7	0.1 ± 0.1	nd	0.1 ± 0.0	1.6 ± 0.2	nd	41.4 ± 6.7
48	0.1 ± 0.0	9.0 ± 0.4	4.3 ± 0.4	0.1 ± 0.0	nd	0.1 ± 0.0	1.6 ± 0.2	nd	4.7 ± 1.8
168	nd	6.1 ± 0.9	1.7 ± 0.5	0.1 ± 0.0	nd	0.1 ± 0.0	0.3 ± 0.1	nd	nd

A quantidade de porfirina recuperada vem expressa em ng de droga por mg de tecido ou ml de soro. As valores apresentados referem-se a análises independentes realizadas a grupos de três animais (valor médio ± desvio padrão). nd: não detectável.

Gráfico 1 – Quantidade de porfirina recuperada quando injectada numa dose de 1 mg/kg de fotossensibilizador incorporado em DPPC

Tabela 2 - Selectividade (tumor/músculo e tumor/pele) dos diferentes derivados porfirínicos 24 h após administração de 1,0 mg/kg por via intravenosa de fotossensibilizador em DPPC e atraso no crescimento do tumor de ratos Balb/c submetidos a uma irradiação de 400 J/cm² com luz vermelha de potência de 230 mW/cm²

Fármaco	Tumor/ Músculo	Tumor/ Pele	Atraso no crescimento (dias)
D1	140	24	2-3
D2	20	5	1,3
D3	62	24	2,4
D4	4	4	1,2

Estudos de PDT

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o melhor período para realizar a irradiação da área tumoral são as 24 h após a injeção do fotossensibilizador. Os estudos de PDT foram realizados no mesmo modelo animal sujeito ao mesmo tipo de implante de células de fibrossarcoma descrito para os estudos farmacocinéticos (ver Esquema 4). Após a administração do fotossensibilizador aguardou-se 24 h e a área tumoral foi exposta a luz vermelha (λ 600-700 nm) com uma potência de 230 mWcm⁻² tendo sido fornecida uma dose total de luz de 400 Jcm⁻². A resposta do fibrossarcoma foi determinada por

medição diária do volume dos tumores irradiados. No Esquema 4 é apresentado um gráfico onde se compara o crescimento do fibrossarcoma MS-2 dum grupo de ratos sujeito a tratamento de PDT com o dímero D1(droga+luz) *versus* um grupo de ratos não tratados de controlo. O atraso observado no crescimento do tumor para os vários dímeros estudados encontra-se apresentado na Tabela 2.

Esquema 4

Merece referência o facto de os nossos resultados serem idênticos aos obtidos com a Photofrin no mesmo modelo animal mas, no nosso caso, utilizou-se uma dose 10 vezes inferior.

Os nossos estudos, embora preliminares, mostram que os fotossensibilizadores, especialmente o dímero D1 e D3, apresentam características bastante encorajadoras no sentido de poderem ser utilizados em estudos de PDT. São compostos puros e de síntese relativamente fácil e reprodutível. Absorvem na região do vermelho, considerada ideal para estudos de PDT, apresentam boa selectividade para o tecido tumoral, a sua eliminação da corrente sanguínea é rápida e a acumulação na pele é baixa, o que minimiza o efeito indesejável da fotossensibilidade cutânea. No entanto, outros estudos a nível de PDT terão de ser realizados, nomeadamente a altura em que deve ser realizada a irradiação (a distribuição celular às 24 h após injeção poderá não ser a melhor para se observar uma maior eficiência em PDT), o tipo e a potência de irradiação poderão não ter sido os ideais. Sabe-se, por exemplo, que a irradiação com uma luz contínua ou pulsada poderá ter respostas diferentes em termos de PDT.

Agradecimentos:

Aos meus colegas, Profs. Doutores J. A. S. Cavaleiro, Artur M. S. Silva e Augusto C. Tomé por toda a colaboração prestada. Ao Prof. Giulio Jori (Universidade de Pádua, Itália) pela oportunidade que nos deu para a realização dos estudos biológicos e ao Prof. Hans-D. Brauer (Universidade de Frank-

furt, Alemanha) pelos estudos fotofísicos que realizou. À aluna de doutoramento Maria do Amparo F. Faustino, responsável pela síntese dos compostos e pelos estudos biológicos apresentados, o meu reconhecimento muito especial do seu trabalho. À Universidade de Aveiro, ao Human Capital and Mobility Programme e à JNICT/ "Fundação para a Ciência Tecnologia" pelos financiamentos concedidos à Unidade de Investigação nº62/94 e ao projecto ERBCHRXCT930178.

REFERÊNCIAS

1. *Metalloporphyrins in Catalytic Oxidations*, ed. Roger A. Sheldon, Marcel Dekker Inc., New York, (1994).
2. J. Dobson, S. Saini, *Anal. Chem.* **69** (1997) 3532.
3. *Light-Activated Pest Control*, ed. J. R. Heitz e Kelsey R. Dwnum, ACS Symposium Series 616, Washington, DC (1995) 4.
4. R. Wasielewski, *Chem Rev.*, **92** (1992) 435.
5. *Organic Superconductivity*, ed. V. Z. Kresnin e W. A. Little, Plenum Press, New York, (1990); R. W. Wagner; J. S. Lindsey, *J. Am. Chem. Soc.*, **116** (1994) 9759.
6. R. Bonnett, *Chem. Soc. Rev.*, **24** (1995) 19; B. W. Henderson e T. J. Dougherty, *Photodynamic Therapy: Basic Principles and Clinical Applications*, ed. Marcel Dekker, Inc., New York (1992).
7. M. A. Faustino, M. G. P. M. S. Neves, M. G. H. Vicente, J. A. S. Cavaleiro, M. Neumann, H-D. Brauer e G. Jori, *Photochem. and Photobiol.*, **66** (1997) 405.
8. M. A. Faustino, M. G. P. M. S. Neves, M. G. H. Vicente, A. M. S. Silva e J. A. S. Cavaleiro, *Tetrahedron Lett.*, **37** (1996) 3569.
9. M. A. Faustino, M. G. P. M. S. Neves, M. G. H. Vicente, A. M. S. Silva e J. A. S. Cavaleiro, *Tetrahedron Lett.*, **36** (1995) 5977.
10. M. A. Faustino, M. G. P. M. S. Neves, A. M. S. Silva and J. A. S. Cavaleiro, *Chimia*, **7** (1997) 472.
11. M. A. Faustino, M. G. P. M. S. Neves, A. M. S. Silva e J. A. S. Cavaleiro, *ICOS-12*, (1998), PD54, Veneza.

Sessões Experimentais

Cor, pigmentos e plantas

LÍGIA M. RODRIGUES

Departamento de Química, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-320 Braga, Portugal
Ligiar@ci.uminho.pt

In the class of people who are interested in facts and ideas, we have, of course, most scientists, and also a good number of nonscientists who think along the some lines even though they don't have scientific training. In the other class- those interested in words- we have some scientists and some philosophers, and many nonscientists. I remember reading a book on philosophy in which the author went on, page after page, on the question: If there is a leaf on a tree and you see that it is green in the springtime and red in fall, is that the same leaf or is it a different leaf? Is the essence of leafness still in it? Words, words, words, but "chlorophyll" and "xanthophyll"- which are sensible in this connection of what has happened to that leaf- just don't appear at all.

Linus Pauling [1]

1. INTRODUÇÃO

As plantas verdes têm uma função vital importante na conversão da energia solar em matéria orgânica. Há vários pigmentos nas plantas que absorvem luz visível no passo inicial da fotossíntese. As suas estruturas moleculares são conhecidas, e o seu isolamento relativamente fácil.

As células das zonas verdes das plantas contêm pigmentos denominados clorofilas que lhe conferem a cor verde. Nas plantas superiores existem em duas formas ligeiramente diferentes clorofila-a e clorofila-b.

Clorofila-a (X=CH₃); clorofila-b (X=CHO)

A clorofila-a, verde azulada, e a clorofila-b, verde amarelada, contêm um sistema de porfirina complexado com magnésio (II) e com várias cadeias laterais; a clorofila-b tem um

grupo -CHO no anel II, a clorofila-a um grupo metilo. A separação destes dois componentes foi feita pela primeira vez em 1913 por R. Wiistatter (1872-1942), e em 1960 R. B. Woodward (1917-1979) e seus colaboradores que conseguiram a síntese total de clorofila.[1]

Há vários outros pigmentos nas plantas que absorvem luz visível. São compostos simétricos com sistemas de ligações duplas conjugadas. Neste tipo de compostos incluem-se os carotenóides: β -caroteno, licopeno, crocina (conferem a cor à cenoura, ao tomate e ao açafrão), as xantofilas (luteína, violaxantina), dentro dos mais comuns.

As estruturas moleculares de alguns pigmentos fotossintéticos são apresentadas a seguir:

β -caroteno

licopeno

crocina

luteína

violaxantina

Lígia M. Rodrigues é licenciada em Engenharia Química pela Universidade de Lourenço Marques e doutorada em Química (Química Orgânica) pela Universidade do Minho. É Professora Auxiliar do Departamento de Química da Universidade do Minho.

É membro do IBQF-UM e os seus interesses científicos estão centrados na Química dos Péptidos

neoxantina

Nesta experiência serão isolados alguns pigmentos fotosintéticos de plantas verdes, nomeadamente as clorofilas e o β -caroteno, e identificados por comparação com dados espectrais de absorção no visível. A separação destes pigmentos será feita por cromatografia em coluna, usando para controle da separação a cromatografia em camada fina.

Na tabela 1 apresentam-se os dados espectrais de absorção no visível, que serão usados na identificação dos pigmentos isolados. A tabela 2 relaciona a cor da radiação absorvida e da radiação transmitida (cor observada).

Tabela 1- Absorção máxima e coeficientes de extinção de alguns pigmentos

Pigmento	$\lambda_{\text{máx}}/\text{nm}$ (máx $\times 10^3$)
clorofila-a	408 (68), 428 (111), 577 (7,4), 613 (13), 660 (85)
clorofila-b	430 (70), 445 (170), 600 (13), 644 (62)
β -caroteno	427 (127), 449 (190), 475 (120)
luteína	422 (-), 445 (140), 474 (-)
violaxantina	417 (115), 440 (150), 469 (125)
neoxantina	415 (130), 438 (130), 467 (100)

Tabela 2- Absorção e cor

Luz absorvida λ (nm)	Luz transmitida Cor	Cor que se vê
400-435	violeta	verde-amarelo
435-485	azul	amarelo
480-490	verde-azul	laranja
490-500	azul-verde	vermelho
500-560	verde	púrpura
560-580	amarelo-verde	violeta
595-605	laranja	verde-azul
605-750	vermelho	azul-verde

2. CROMATOGRAFIA

A cromatografia de adsorção foi utilizada, pela primeira vez, em 1900 por D.T. Day, um químico norte americano da indústria do petróleo. Em 1903, um botânico russo, M.S. Tswett, empregou esta técnica na sua investigação sobre os pigmentos em plantas verdes. As aplicações desta técnica só foram vulgarizadas a partir de 1930. Os resultados mais espetaculares foram obtidos nas separações dos pigmentos de vegetais e de produtos naturais, porém hoje em dia a cromatografia aplica-se no quotidiano de todos os laboratórios e indústrias para a separação das mais diversas misturas.

Todos os métodos cromatográficos envolvem a interação entre uma fase móvel, que pode ser um gás ou um líquido, e uma fase estacionária, que pode ser um líquido ou um sólido.

2.1 Cromatografia em coluna [2]

Nesta forma de cromatografia a mistura a separar é dissolvida numa pequena quantidade de solvente apropriado e aplicada no topo de uma coluna contendo um **adsorvente** sólido finamente dividido, que serve como fase estacionária. A seguir passa-se através da coluna um **solvente de eluição**, a fase móvel. Os componentes individuais da mistura, inicialmente adsorvidos na fase estacionária, no topo da coluna, movem-se com o solvente de eluição a diferentes velocidades que dependem da sua afinidade para a fase estacionária; um componente fracamente adsorvido move-se mais rapidamente que um muito adsorvido. À medida que os componentes individuais saem da coluna são recolhidos em contentores separados.

A quantidade de adsorvente usada para preparar colunas varia de acordo com as diferenças nos coeficientes de distribuição e polaridades dos componentes individuais do sistema cromatográfico. Para separações simples pode usar-se 10g de adsorvente para 1 g de mistura, mas para componentes com polaridades semelhantes esta razão deve ser aumentada para 100-200:1; um bom ponto de partida é 25:1. Outra regra útil refere-se à razão altura: diâmetro da coluna que deverá ser cerca de 8:1.

Os adsorventes sólidos polares vulgarmente usados na separação de compostos orgânicos incluem, por ordem crescente de polaridade, alumina (Al_2O_3), gel de sílica ($\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) e Florisil (silicato de magnésio activado).

A escolha do solvente de eluição para uma dada separação é uma decisão importante ao planear uma separação por cromatografia. O melhor solvente ou combinação de solventes é determinado por tentativa e erro. Na maior parte dos casos o método mais eficiente para a escolha do solvente é efectuar uma série de tentativas por TLC.

A coluna é feita de vidro com uma torneira Teflon ou um pedaço de tubo com uma mola para controlar o fluxo de solvente. Usando uma vareta insere-se um pedaço de algodão no fundo da coluna para impedir que o material de empacotamento saia da coluna. Uma camada de areia é colocada por cima do algodão para criar um leito homogêneo para o adsorvente.

Há duas formas de fazer o enchimento das colunas: o **enchimento seco**, em que se verte, lentamente, o adsorvente sólido e seco para a coluna que está semi-cheia com o solvente que foi seleccionado como eluente. Na outra técnica, **enchimento molhado**, usa-se uma suspensão do adsorvente no solvente; este método é mais adequado quando se usa gel de sílica. Em qualquer dos métodos, à medida que o sólido se deposita, deverão dar-se pequenas pancadas na coluna para obter um enchimento uniforme, sem bolhas de ar. Nesta operação deve escoar-se algum solvente sem, contudo, deixar secar o topo da coluna.

Após terminado o enchimento coloca-se outra camada de areia que (1) permite um fluxo contínuo de solvente, na

superfície do adsorvente, e (2) impede a perturbação do enchimento, quando se adiciona o eluente.

A mistura a separar aplica-se no topo da coluna dissolvida no volume mínimo de solvente. É importante distribuir a amostra uniformemente na superfície do adsorvente. Se se usar demasiado solvente obtêm-se bandas largas e uma má separação da mistura.

2.2 Cromatografia em camada fina (TLC)

A cromatografia em camada fina envolve os mesmos princípios da cromatografia em coluna. Ao contrário da cromatografia em coluna em que a fase móvel se desloca no sentido descendente ao longo da coluna, em TLC a fase móvel desloca-se no sentido ascendente da camada fina de adsorvente. A TLC é mais rápida e necessita de muito menor quantidade de amostra, 10⁻⁹g.

Na cromatografia em camada fina o adsorvente (alumina ou gel de sílica) de espessura uniforme é colocado numa placa de material rígido (vidro, plástico). Estas placas estão disponíveis no mercado no tamanho de 20x20 cm, que depois são cortadas em tamanhos adequados.

A mistura a separar é usada em solução, colocando uma pequena gota na parte inferior da placa, e a eluição é feita numa câmara fechada contendo o solvente apropriado; o nível de solvente dentro da câmara deverá estar abaixo do ponto de aplicação. O solvente sobe por capilaridade ao longo da placa e arrasta consigo, a diferentes velocidades, os componentes da mistura. Quando a frente do solvente se aproxima do topo da placa esta é retirada da câmara.

A detecção dos componentes da mistura pode ser feita de várias formas: detecção visual, para compostos corados, por reacção com reagentes específicos (pulverização das placas com ninidrina, ácido sulfúrico entre outros), e por exposição a vapores de iodo.

Como câmara cromatográfica pode usar-se um frasco com rolha ou um "globé" tapado com um vidro de relógio. Como se mostra na figura abaixo coloca-se uma folha de papel de filtro

dobrada dentro da câmara e adiciona-se solvente suficiente para atingir um nível de cerca de 1 cm. Agita-se para saturar a atmosfera da câmara com vapores de solvente. A saturação impede a evaporação do solvente da placa durante o desenvolvimento do cromatograma.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Materiais necessários

Folhas de plantas verdes
Areia lavada; Sulfato de sódio anidro
Acetona; Éter de petróleo 40-60
Misturas de acetona:éter de petróleo nas proporções 10:90 e 25:75.
Gel de sílica para cromatografia em coluna
Placas de gel de sílica para TLC
Almofariz; Vareta de vidro; Erlenmeyers de 100 ml
Copos de 100, 200 e 400 ml; Proveta de 50 ml
Funil e papel de filtro; Funil de decantação
Coluna de vidro; Mola de Mohr; 10 cm de tubo de borracha; Algodão.
Capilares; Caixa de Petri; Suporte universal

3.2 Extração dos pigmentos

Corte cerca de 10 g de folhas de plantas (ervas, espinafres, agriões, etc.), em bocados pequenos e macere-as num almofariz com uma pequena quantidade de areia. Transfira o material para um copo de 200 ml, adicione 30 ml de acetona e agite. Deixe repousar 10 minutos, junte 20 ml de água e agite de novo. Filtre a solução para um funil de separação. Adicione 30 ml de éter de petróleo 40-60, deixe repousar e recolha a fase orgânica para um Erlenmeyer. Seque a solução com Na₂SO₄, durante cerca de 10 minutos e filtre. Evapore o solvente até ficar com 2-3 ml de solução.

3.3 Cromatografia em camada fina

Numa placa de sílica aplique, na linha de partida, uma ou mais gotas do extracto, até obter uma mancha intensamente corada. Faça a eluição utilizando como solvente uma mistura de acetona/ éter de petróleo 40-60 (25:75).

3.4 Separação dos pigmentos (Cromatografia em coluna)

Prepare a coluna do seguinte modo: Coloque um pouco de algodão na base da coluna. Sobre este coloque aproximadamente 0,5 cm de areia. Encha a coluna até um terço com éter de petróleo e junte uma suspensão de sílica (5 g) em éter de petróleo. Deixe assentar e adicione uma nova camada (fina) de areia. Deixe escoar o solvente até que o nível atinja quase a camada superior da areia e aplique a solução concentrada do extracto de pigmentos. Deixe que a solução penetre na coluna e lave a parte superior com 2-3 ml de éter de petróleo (não deixe secar a coluna no topo). Inicie a eluição da coluna utilizando como eluente acetona/éter de petróleo 40-60 (10:90) e continue até recolher a fracção amarela (carotenóides).

Mude o eluente para acetona/éter de petróleo 40-60 (25:75) que vai separar uma das clorofilas (clorofila-a, verde). Remova a zona verde restante (clorofila-b, amarelo esverdeado) utilizando clorofórmio como eluente.

3.5 Espectrofotometria de absorção

Prepare duas células de quartzo (para UV) uma com o pigmento cujo espectro pretende registar e outra com o solvente em que o pigmento se encontra dissolvido. Trace o espectro de absorção dos pigmentos isolados na região 350-700 nm, compare os λ com os valores tabelados.

4. RISCOS E SEGURANÇA

Não respire as poeiras de gel de sílica.
Os solventes orgânicos são combustíveis. Não aproxime chamas.
Solventes usados neste trabalho:
Éter de petróleo 40-60: R11; S9-16-29-33
Acetona: R11; S9-16-23c-33 Clorofórmio: R22-38-40-48/20/22; S36/37

Tabela de riscos e segurança [3,4]

R	Riscos específicos
R11	Facilmente inflamável
R22	Nocivo por ingestão
R38	Irrita a pele
R40	Possibilidade de efeitos irreversíveis
R48/20/22	Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolonga-da por inalação ou ingestão
S	Conselhos de segurança em relação a substâncias perigosas
S9	Conservar o recipiente em local bem arejado
S16	Proteger de fontes de ignição. Não fumar
S23c	Não respirar os vapores
S29	Não lançar os resíduos no esgoto
S33	
S36/37	Evitar a acumulação de cargas electrostáticas Usar vestuário de protecção e luvas

5. OUTRAS SUGESTÕES:

- **Extracção e isolamento do licopeno da pasta de tomate**-Proceda de forma análoga à descrita (cerca de 2 cm de pasta de tomate, 5 ml de acetona, 5 ml de água e 5 ml de éter de petróleo. Separe e cromatografe o extracto de éter de petróleo.)
- **Extracção e isolamento dos pigmentos da paprika**- Os principais pigmentos da paprika responsáveis pela intensa coloração vermelha, são ésteres de ácidos gordos da capsantina e capsorbina. Para além destes a paprika contem também o β-caroteno, amarelo. A extracção destes pigmentos consegue-se refluxando (~ 1,5 g) em diclorometano (15 ml) durante 25 minutos. Cromatografe o extracto colorido de forma análoga à descrita para as plantas verdes mas use diclorometano em vez de éter de petróleo.

BIBLIOGRAFIA:

1. Roesky, H.W. e Mckel K., “Chemical Curiosities”, VCH, 1996, 183-185.
2. Roberts, R.M., Gilbert J.C., Martin, S.F., “Experimental Organic Chemistry”, Saunders College Publishing, 1994.
3. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, nº 69, 1998.
4. “Seguridad en Laboratorios de Quimica”, Panreac Quimica SA.

Cor e Equilíbrio

ANA P. ESTEVES e ANA M. FREITAS

Departamento de Química, Universidade do Minho, Largo do Paço, 4700-320 Braga, Portugal
aesteves@ci.uminho.pt; amfreitas@ci.uminho.pt

O equilíbrio químico constitui um dos temas leccionados no Ensino Secundário. Dado que às autoras parece ser mais aliciante o ensino da Química aliado a demonstrações elucidativas da matéria em estudo, especialmente se forem coloridas, pretende-se com estas experiências facultar aos professores do Ensino Secundário alguns procedimentos experimentais de fácil execução, envolvendo produtos químicos acessíveis e não muito dispendiosos. Não houve pretensão de originalidade, pelo que se apresentam demonstrações da literatura, com algumas adaptações.

1. COR, SOLUBILIDADE E EQUILÍBRIO DE IÕES COMPLEXOS DE NÍQUEL (II) EM SOLUÇÃO AQUOSA [1]

1.1. INTRODUÇÃO

Os reagentes são adicionados numa ordem específica a um copo grande contendo uma solução aquosa de sulfato de níquel. Os iões complexos de níquel (II) são preparados usando soluções aquosas de amónia, etilenodiamina e dimetilglioxima. À medida que cada ião complexo é formado pode observar-se a sua cor e a sua solubilidade. Esta demonstração permite evidenciar as diferentes cores de complexos de níquel (II) e as suas estabilidades relativas e discutir as diferentes geometrias. Etilenodiamina e dimetilglioxima são ligandos bidentados que formam complexos com Ni(II)^{2+} os quais são diferentes em termos de cor, geometria e estabilidade.

1.2. GEOMETRIA E COR DE ALGUNS COMPLEXOS

• ião hexa-aquoníquel (II): $\text{Ni(H}_2\text{O)}_6^{2+}$ cor: verde; estrutura: octaédrica

• ião hexa-aminoníquel (II): $\text{Ni(NH}_3)_6^{2+}$ cor: azul escuro; estrutura: octaédrica; $K(30^\circ\text{C}) = 6,46 \times 10^6$

• ião diaquobis(etilenodiamino) níquel (II): $[\text{Ni(H}_2\text{O)}_2(\text{en})_2]^{2+}$; cor: azul; estrutura: octaédrica; $K(25^\circ\text{C}) = 5,62 \times 10^{13}$

• ião tris(etilenodiamino)níquel (II): Ni(en)_3^{2+} cor: púrpura; estrutura: octaédrica; $K(25^\circ\text{C}) = 3,31 \times 10^{16}$

• ião bis(dimetilglioximato)níquel (II): Ni(dmg)_2 cor: vermelho; estrutura: planar quadrada; $K(25^\circ\text{C}) = 4,17 \times 10^{17}$

1.3. PARTE EXPERIMENTAL

1.3.1. Material e equipamento

1 copo de 500 mL
1 proveta de 100 mL
2 provetas de 10 mL
1 proveta de 25 mL
1 barra magnética
1 placa de agitação

1.3.2. Reagentes

10 mL de NiSO_4 1M
+ 20 mL de NH_3 5M
+ 10 mL de etilenodiamina 25%
+ 12,5 mL de dimetilglioxima 1%

100 mL de água destilada

Ana P. Esteves licenciou-se em Química (Ramo Científico), pela Univ. de Lisboa, em 1987 e doutorou-se em Ciências, pela Univ. do Minho, em 1995, sendo actualmente Professora Auxiliar no Departamento de Química da Univ. do Minho. Desenvolve investigação no Centro de Química da Univ. do

Minho nas áreas de síntese assimétrica, de hidratos de carbono e de electrossíntese orgânica.

Ana M. Freitas licenciou-se em Química, pela Universidade de Lourenço Marques, em 1974 e doutorou-se em Química Orgânica, pelo UMIST (Inglaterra) em 1980, sendo actualmente Professora Associada do Departamento de Química da Univ. do Minho. Desenvolve investigação no Centro de Química da Univ. do Minho nas áreas de síntese assimétrica, de hidratos de carbono e de electrossíntese orgânica.

Para preparar 1L de NiSO₄ 1M:

Dissolver 263 g de sulfato de níquel hexa-hidratado (NiSO₄·6H₂O) em água destilada e diluir para 1 L.

Para preparar 1L de NH₃ 5M:

Diluir 333 mL de hidróxido de amónio concentrado (15 M) para 1 L com água destilada.

Para preparar 1L de etilenodiamina 25%:

Diluir 250 mL de etilenodiamina para 1 L com água destilada.

Para preparar 1L de dimetilglioxima 1%:

Dissolver 10 g de dimetilglioxima em 1 L de etanol.

1.3.3. Procedimento

Deitar 100 mL de água destilada num copo grande e introduzir uma barra magnética. Colocar o copo sobre uma placa de agitação e ligá-la.

Adicionar 10 mL de NiSO₄ 1M e observar a cor da solução e a sua intensidade.

Adicionar, pela ordem indicada, 20 mL de NH₃ 5M, 10 mL de etilenodiamina 25% e 12,5 mL de dimetilglioxima 1%. Após cada adição observar a cor e o aspecto da solução.

1.4. RISCOS E SEGURANÇA

Os sais de níquel e as soluções são irritantes para os olhos por contacto e venenosos por ingestão. A etilenodiamina é cáustica e os seus vapores são irritantes para a pele, olhos e sistema respiratório, devendo ser manuseada numa “hotte”. A amónia concentrada é muito irritante para a pele, olhos e sistema respiratório devendo também ser manuseada numa “hotte”.

2. AS CORES DO ARCO-ÍRIS

2.1. INTRODUÇÃO

Os indicadores ácido-base são ácidos orgânicos fracos (designados por IH) cuja desprotonação é acompanhada por uma variação de cor.

No esquema seguinte apresenta-se o efeito de base no indicador fenolftaleína:

Na prática, muitas vezes são usadas misturas de indicadores, por exemplo, o indicador universal que fornece informação preliminar sobre o carácter ácido (vermelho), neutro (amarelo a amarelo esverdeado) ou básico (verde e azul) de uma solução.

Nesta experiência, a adição de hidróxido de sódio, cuja

concentração é cinco vezes superior à do HCl, provoca uma mudança do carácter da solução de ácido para básico; as misturas indicadoras são escolhidas de tal modo que se formam as cores do arco-íris [2,3].

2.2 PARTE EXPERIMENTAL

2.2.1. Material e equipamento

6 tubos de ensaio + suporte
2 balões volumétricos de 100 mL
6 espátulas
6 vidros de relógio
6 funis de vidro de haste comprida
1 folha branca

2.2.2. Reagentes

50 mg de vermelho de fenol
132 mg de vermelho de metilo
8 mg de fenolftaleína
10 mg de azul de metileno
42 mg de verde brilhante
8 mg de púrpura de *m*-cresol
25 mg de azul de bromofenol
25 mg de vermelho de alizarina
40 mL de HCl 0,002 M
18 mL de NaOH 0,01 M
10 mL de etanol

2.2.3. Procedimento

Introduzir 50 mg de cada um dos indicadores abaixo referidos em 6 tubos de ensaio, com o auxílio de um funil de vidro de haste comprida:

- tubo 1 - vermelho de fenol;
- tubo 2 - vermelho de metilo-HCl (42 mg) + fenolftaleína (8 mg) (razão 5:1; cor 1 - rosa; cor 2 - laranja);
- tubo 3 - vermelho de metilo-HCl;
- tubo 4 - vermelho de metilo-HCl (40 mg) + azul de metileno (10 mg) (razão 4:1; cor 1: azul; cor 2 - verde)
- tubo 5 - verde brilhante (42 mg) + púrpura de *m*-cresol (8 mg) (razão 5:1; cor 1: azul/verde; cor 2 - azul);
- tubo 6 - azul de bromofenol (25 mg) + vermelho de alizarina (25 mg) (razão 1:1; cor 1: amarelo; cor 2 - violeta).

Adicionar, a cada tubo, 7 mL de uma solução preparada por diluição de 40 mL de HCl 0,002 M com 10 mL de etanol. Obtêm-se as cores seguintes:

- tubo 1 - laranja; tubo 2 - rosa; tubo 3 - vermelho; tubo 4 - azul; tubo 5 - azul-esverdeado; tubo 6 - amarelo.

Se se tratar cada uma destas soluções com uma quantidade igual de NaOH 0,01 M (3 mL) e agitar, aparecem as cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta). Se se colocar uma folha branca atrás dos tubos, esta torna as cores mais “brilhantes”.

BIBLIOGRAFIA

1. B.Z. Shakhshiri, G.E. Dirreen, *J. Chem. Ed.*, **57**, 1980, 900.
2. R.E. Loffredo, D. Crookston, *J. Chem. Ed.*, **70**, 1993, 774.
3. H.W. Roesky, K. Möckel, “Chemical Curiosities”, VCH, Weinheim, 1996, págs 123-125.

Cor e Oxidação-Redução

ANTÓNIO M. FONSECA^a e EDUARDO M. FALCÃO^b

^a Departamento de Química, Escola de Ciências, Universidade do Minho, Largo do Paço, P-4700-320 Braga, Portugal

^b Escola B.2,3 de Real, Av. S. Frutuoso, Braga.

As actividades experimentais são um recurso que nenhum professor de Química deve dispensar. Por um lado, mesmo actividades experimentais simples encerram em si um potencial apreciável como motivadores de discussão e fontes de perguntas; por outro lado, há competências e aptidões que só se podem desenvolver à custa de actividades experimentais.

Na selecção das actividades que se seguem obedecemos a vários critérios que nos pareceram relevantes e de entre os quais destacamos: serem coloridas e agradáveis de seguir, serem fáceis de realizar e de baixo custo económico; constituírem um conjunto razoavelmente coeso e ordenado passível de vir a ser utilizado no ensino Básico e/ou Secundário como apoio a uma introdução às reacções de oxidação-redução.

Dada a quantidade de referências disponível, não houve qualquer preocupação em ser original mas, apenas, compilar algumas das muitas actividades experimentais já descritas e introduzir pequenas adaptações de pormenor que julgamos melhorar a actividade.

1. PILHA DE VOLTA

Esta poderá ter sido uma das primeiras aplicações das reacções de oxidação-redução: a produção de corrente eléctrica. Galvani observou que as coxas da rã que estudava suspensas em fios de cobre se contraíam quando tocavam em objectos de ferro Volta interpretou este facto não com base num qualquer conceito de “electricidade animal” mas com base numa ideia nova ainda que não totalmente correcta - metais diferentes originam um fenómeno eléctrico quando são postos em contacto. Vamos recriar o protótipo de Volta. Nesta pilha o eléctrodo positivo é o cobre e o negativo é o zinco.

Parte experimental

Material	Reagentes
Papel mata-borrão	Sumo de limão
2 troços com cerca de 15 cm de fio de cobre	10 moedas de 5\$00 e folha de alumínio
Fita-cola	1 LED vermelho

António M. Fonseca, licenciou-se em Ensino de Física e Química e doutorou-se em Ciências pela Universidade do Minho, sendo actualmente Prof. Auxiliar no De-

partamento de Química da Universidade do Minho. Faz investigação na área da química de coordenação e electroquímica.

Eduardo M. Falcão, licenciou-se em Ensino de Física e Química pela Universidade do Minho e é mestre em química (especialidade em ensino) pela Universidade do Minho, sendo actualmente Professor do Quadro de nomeação definitiva a exercer funções na Escola Básica 2,3 de Real, Braga. Interessa-se por áreas relacionadas com a didáctica da química e, em particular, pela vertente experimental.

Procedimento

Empilhe os discos separando-os por um disco de mata-borrão embebido em solução diluída de ácido sulfúrico (use a sequência moeda-papel-alumínio). Ligue os fios de cobre no primeiro e no último disco da pilha com fita-cola e encoste as suas extremidades à língua. Se quiser usar o LED como detector de corrente não se esqueça que a perna mais comprida deve ser ligada ao terminal positivo!

Segurança: Ácido sulfúrico: R: 35; S: 2-11-23-24-26-30.

2. VULCÃO

Esta reacção é de bom efeito junto dos alunos mais novos e serve para ilustrar uma reacção com o oxigénio - a redução do dicromato a Cr³⁺.

Parte experimental

Material	Reagentes
cápsula de porcelana	dicromato de amónio
fósforos	
torcida de papel	

Procedimento

Na cápsula de porcelana faça um pequeno montículo de dicromato de amónio e no seu vértice insira uma torcida de papel (de preferência embebida em álcool etílico). Ateie a torcida e afaste-se. Verá a conversão do ião dicromato a Cr³⁺ (verde) acompanhado de um grande aumento de volume e uma certa ejeção de material tal e qual como um vulcão a libertar cinzas para o espaço.

Segurança: Use óculos de segurança. Acautelar das projecções de material que irão ocorrer durante a experiência. O recipiente onde decorre a reacção vai aquecer bastante e, por isso, deverá ser resistente ao calor e estar assente numa base isolante para não provocar danos na mesa. Dicromato de amónio: R:1-8-36/37/38-43; S:28-35.

3. PREGOS GALVANIZADOS, TINTURA DE IODO E LIXÍVIA¹

Nesta actividade usam-se produtos comuns para fazer uma

reação de oxidação-redução usada nas iodometrias: a redução do iodo I_2 a I^- . A reação é um pouco lenta mas o efeito é perceptível no espaço de uma hora; entretanto, pode aproveitar-se o tempo disponível para fazer uma discussão com os alunos sobre o que estará a acontecer. A este passo inicial, segue-se a adição de ião hipoclorito (ClO^-) para reagir com o I^- e o converter à forma original I_2 ; a adição posterior de vinagre fará desaparecer o hidróxido de zinco insolúvel que entretanto se formou devido à elevação de pH.

Desaparecimento do precipitado de hidróxido de zinco:

A redução do iodo é espontânea em presença do zinco (presente nos pregos galvanizados, por exemplo): a oxidação do zinco tem um potencial de +0,76 V; a redução do iodo tem um potencial de +0,54 V; a reação total tem um potencial de +1,30 V por isso é espontânea.

Por seu lado, a reação de oxidação do iodo tem um potencial de -0,54 V; a reação de redução do ião hipoclorito ($ClO^- + H_2O + 2 e^- \rightarrow Cl^- + 2 OH^-$) tem um potencial de +0,84 V; a reação de oxidação-redução total tem um potencial de +0,30 V e, é também espontânea.

Parte experimental

Material	Reagentes
pregos galvanizados	tintura de iodo
copo de vidro transparente	lixívia comercial
	vinagre

Procedimento

Cubra o fundo do recipiente com uma quantidade razoável de pregos. Adicione tintura de iodo de forma a NÃO cobrir todos os pregos (mais vale tintura a menos do que a mais). Espere cerca de uma hora. Ao fim desse tempo deve ver uma já nítida descoloração do líquido, sinal evidente da passagem do I_2 a I^- (incolor). Adicione algumas gotas de lixívia e observe o reaparecimento da cor típica do I_2 . Se adicionar uma pequena porção de vinagre verá a cor intensificar-se devido à solubilização do hidróxido de zinco entretanto formado.

Segurança: Não há indicações específicas.

4. ANALISADOR DE ALCOOLÉMIA²

Alguns dos analisadores de alcoolémia comercialmente disponíveis usam o princípio que está na base desta actividade: os álcoois primários e secundários são oxidados em meio ácido por agentes oxidantes fortes como o dicromato de potássio; nesta reação o ião dicromato (laranja) é reduzido a ião crómio (verde).

Na realidade o processo não é tão directo já que o etanol é convertido a etanaldeído, e este em presença de água é que é convertido a ácido acético. O teor em álcool pode ser estimado fotometricamente pela intensidade da coloração verde associada à presença do ião Cr^{3+} .

Parte experimental

Material	Reagentes
Tubos de ensaio de 16 mm	Solução de $K_2Cr_2O_7$ acidificada com H_2SO_4
Rolhas (com dupla perfuração)	Etanol
Tubo de plástico	

Procedimento

Faça a montagem de acordo com o esquema seguinte.

Fig. 1 - Analisador de alcoolémia

Pela extremidade do tubo ligado à entrada do recipiente que contém etanol sopra durante algum tempo para enviar para o segundo tubo o vapor suficiente para iniciar a reação. Observe a mudança de cor na solução do segundo tubo de ensaio.

Segurança: Tome os cuidados necessários para impedir a ingestão accidental de qualquer das substâncias utilizadas. Dicromato de potássio R: 36/37/38-43, S: 22-28; Ácido sulfúrico: R: 35, S: 26-30-45; Etanol: R: 11, S: 7-16

5. ELECTRÓLISES

As electrólises são processos em que através do fornecimento de energia eléctrica fazemos com que ocorram reações não espontâneas. Numa electrólise ocorrem dois processos concertados e simultâneos: nos eléctrodos ocorrem as reações de oxidação-redução propriamente ditas e, na solução electrolítica ocorre migração de iões afim de manter o equilíbrio de cargas no sistema.

Para fazer uma electrólise devemos dispor de uma fonte de corrente contínua com os seus terminais ligados a eléctrodos e estes devem estar mergulhados numa solução electrolítica. Um dos eléctrodos será o cátodo (aquele para onde vão migrar os catiões existentes em solução - terminal negativo) e o outro será o ânodo (para onde vão migrar os aniões em solução - terminal positivo). O fluxo de electrões no circuito externo à solução electrolítica será do ânodo (onde os iões negativos que para aí se encaminharam foram oxidados) para o cátodo (onde os catiões que para aí se dirigiram vão recebê-los para se reduzirem).

A. UMA ELECTRÓLISE DA ÁGUA DIFERENTE [3]

Considere uma célula electroquímica composta por dois eléctrodos inertes, ligados a uma fonte de corrente e mergulhados numa solução aquosa de sulfato de sódio.

O eléctrodo ligado ao terminal negativo da fonte é o cátodo. Este é o eléctrodo através do qual os electrões provenientes da fonte, entram na solução:

Por seu lado, o eléctrodo ligado ao terminal positivo da bateria é o ânodo. É o eléctrodo através do qual os electrões deixam a solução para regressar à fonte:

Quando o circuito é fechado e passa uma corrente através da solução, verifica-se que no ânodo há libertação de oxigénio e formação de H^+ e no cátodo se liberta H_2 , juntamente com a formação de iões OH^- .

A presença do indicador azul de bromotimol com zona de viragem para valores de pH entre 6,0 e 7,6 (amarelo-azul) permite observar as mudanças de cor associadas às variações de pH, junto aos eléctrodos, decorrentes da electrólise.

Parte experimental

Material	Reagentes
1 copo de 50 cm ³	0,5 g de sulfato sódio
1 tubo em U + suporte universal	30 mL de água destilada
2 eléctrodos de níquel	
2 crocodilos	0,5 cm ³ de solução azul de bromotimol
2 pilhas de 9 V e respectivos conectores	
2 fios condutores com cerca de 30 cm	

Procedimento

Adicionar cerca de 0,5 g de sulfato de sódio e 5 gotas de indicador azul de bromotimol ao volume de água necessário para realizar uma electrólise (ca. 30 cm³).

Transferir a solução para o tubo em U e montar o dispositivo para electrólise. Utilizar uma bateria de 12-18 V.

Durante a electrólise observar os dois eléctrodos e as mudanças de cor da solução. No ânodo, devido à formação de iões H^+ o indicador apresenta uma cor amarela. No cátodo, devido à formação de iões OH^- o indicador apresenta uma cor azul. Na solução, os iões H^+ e OH^- reagem observando-se uma cor verde.

Segurança: Sulfato de sódio: R: 36/37/38; S: 26-36

B. ELECTRÓLISE DO IODETO DE POTÁSSIO [4]

Nesta electrólise as semi-reacções são:

Quando o circuito é fechado e passa uma corrente através da solução, verifica-se que no ânodo há formação de I_2 sólido e no cátodo se liberta gás H_2 , juntamente com a formação de iões OH^- . Com a presença de fenolftaleína na solução observa-se o aparecimento da cor rosa à medida que a concentração de OH^- aumenta junto ao cátodo e a deposição de iodo no ânodo.

Parte experimental

Material	Reagentes
1 copo de 50 cm ³	30 mg de KI
1 tubo em U + suporte universal	30 mL de água destilada
2 eléctrodos de carbono e 2 crocodilos	0,5 cm ³ de solução de fenolftaleína
2 pilhas de 9 V e conectores	
dois fios condutores	

Procedimento

Adicionar cerca de 30 mg de iodeto de potássio e 2 gotas de fenolftaleína 30 cm³ de água.

Transferir a solução para o tubo em U e montar o dispositivo para electrólise. Utilizar uma bateria de 12-18 V.

Durante a electrólise observar os dois eléctrodos e a mudança de cor da solução. No ânodo o iodeto é oxidado e a água é reduzida no cátodo. Devido ao facto de o iodo apresentar alguma solubilidade em água, junto do ânodo, a solução irá adquirir uma cor castanho claro. No cátodo poderão observar a formação de hidrogénio.

Segurança: Iodeto de potássio: R: 8-22-36/37/38, S: 17-26-36

6. GALVANOSTEGIA [5]

A galvanostegia é a operação pela qual se recobre por via electrolítica um objecto com uma película metálica. Em geral, utiliza-se um ânodo do metal a depor, uma solução electrolítica que contenha o ião do metal a depor e o objecto que se pretende recobrir a funcionar como cátodo, figura 2.

Fig. 2 - Esquema para a realização de uma galvanostegia.

À medida que o tempo passa, o ânodo vai sendo dissolvido e aparece uma fina camada de metal sobre o objecto.

Parte experimental

Material	Reagentes
1 copo de 50 cm ³	
1 eléctrodo de cobre	Solução aquosa diluída de CuSO_4
Uma moeda de 20\$00	
2 crocodilos	
1 pilha de 9 V	
2 fios condutores	

Procedimento

Faça uma montagem semelhante à da figura da página ante-

rior usando como cátodo a moeda. Aguarde alguns minutos. No ânodo, o cobre metálico dissolver-se-á doando iões cobre à solução. Por seu lado, no cátodo, os iões cobre recebem electrões e depositam-se sob a forma de cobre metálico sobre o objecto.

Segurança: Sulfato de cobre: R: 22-36/38, S: 22.

7. PROTECÇÃO SACRIFICIAL E VITAMINAS [6]

Porque é que se recobrem objectos metálicos com finas camadas de outros metais? As razões podem ser várias mas há uma que nos interessa neste momento: para proteger o objectos da acção corrosiva do oxigénio. Assim, recobrimos os pregos de ferro com zinco porque este é mais reactivo que o ferro face ao oxigénio e portanto reage com o oxigénio em vez do ferro.

No nosso organismo, as vitaminas actuam como elementos protectores exactamente porque são substâncias com bom poder redutor, e assim conseguem evitar que outras substâncias (ainda) mais importantes do que elas sejam oxidadas; podemos dizer que as vitaminas se “sacrificam” para evitar danos por oxidação no nosso organismo.

Nesta actividade, vamos usar o facto já conhecido de que o iodo I₂ em presença de um agente redutor forte é convertido a I⁻ (incolor) para inferir acerca da capacidade redutora da vitamina C.

Parte experimental

Material	Reagentes
1 copo de 50 cm ³	Tintura de iodo
1 vareta de vidro	Sumo de limão ou pastilhas de vitamina C
1 conta gotas	

Procedimento

Cubra o fundo do copo com tintura de iodo e sobre ela deixe cair gota a gota o sumo de limão. Observe a descoloração imediata da tintura de iodo que nos leva a concluir da boa capacidade redutora da vitamina C.

Poderia continuar a actividade confirmando que com a adição de ião hipoclorito o I⁻ regressaria à forma I₂, observando o reaparecimento da cor arroxeadada na sequência da adição de umas gotas de lixívia comercial.

Segurança: Não há riscos específicos a indicar.

SEGURANÇA

A segurança é um dos factores a ter em conta antes, durante e depois da realização de uma actividade experimental. Um dos aspectos que, por vezes, é descurado é a questão da eliminação de resíduos; é verdade que as quantidades de resíduos são, habitualmente muito pequenas mas, também não deixa de ser verdade que ao longo de anos de repetição de uma actividade estas quantidades já começam a ser significativas se estiverem acumuladas sem tratamento nos esgotos. Assim, o bom senso aconselha que se considere cada pequena porção de resíduo como sendo de tratamento indispensável antes de ser eliminado.

Em linhas gerais, pensamos dever aconselhar como mínimo: Diluições de 1:20 ou mais para soluções neutras; não eliminar pelos esgotos soluções fortemente ácidas ou básicas sem

neutralização prévia; não eliminar pelos esgotos solventes halogenados; não eliminar pelos esgotos materiais muito voláteis (éter etílico, éter de petróleo, etc).

Os riscos associados à utilização de cada produto químico são normalmente codificados pelas indicações R encontradas nos catálogos e os procedimentos de segurança a adoptar para cada um são descritos pelas indicações S.

BIBLIOGRAFIA

1. Carl H. Snyder, “*The extraordinary chemistry of ordinary things*”, 2ª ed., John Wiley and Sons (1992) págs. 258-259.

2. Graham Hill e John Holman, “*Chemistry in Context*”, 4ª ed. , Nelson (1995) págs. 526-527.

3. L.R. Summerlin, J.L. Ealy, “*Demonstrações de Química*”, Vol. 2, Sociedade Portuguesa de Química, págs. 231-232.

4. L.R. Summerlin, J.L. Ealy, “*Demonstrações de Química*”, Vol. 2, Sociedade Portuguesa de Química, págs. 227-228.

5. R. Gallagher e P. Ingram, “*Chemistry made clear*”, GSCE edition, 82-83, Oxford University Press (1996).

6. Carl H. Snyder, “*The extraordinary chemistry of ordinary things*”, 2ª ed., John Wiley and Sons (1992) págs. 492-493.

Cor e Luz

SUSANA COSTA^a e FERNANDA PEIXOTO^b

^a Departamento de Química, Universidade do Minho, Campus de Gualtar 4710-320 Braga, Portugal; email: spc@ci.uminho.pt

^b Escola EB 2,3 André Soares, 4710 Braga, Portugal

We know there is no deeper silence in a classroom than that which accompanies the first seconds of a demonstration. Theater directors and nervous concert hall managers envy us those natural seconds of rapt attention. The audience is hushed, awaiting change. The demonstrator does not fail to provide it, with color, flame, smoke and explosion. There ensues- catharsis for the lecturer, a catering to all the senses of the audience, and sometimes the only thing the students remember from a course.

Roald Hoffmann

1- INTRODUÇÃO

A luminescência é a emissão espontânea de radiação por uma espécie química no estado excitado, como resposta a vários factores. A emissão de luz como resultado de uma reacção química, na ausência de estímulo luminoso prévio, denomina-se quimiluminescência e é bastante vulgar na Natureza em animais e plantas, designando-se neste caso bioluminescência. Os exemplos mais conhecidos são a Aurora Boreal, a emissão de luz visível pelos pirilampos e por algumas espécies de peixes, principalmente de águas profundas. Na América do Sul existe uma espécie de escaravelho chamado “cucujo” que emite uma luz verde de tal maneira intensa, que os nativos usam estes insectos como lanternas. Nos pirilampos a espécie responsável por este fenómeno é a luciferina (Fig.1).

Fig. 1 - Luciferina

2 - PARTE EXPERIMENTAL

A - USANDO CLORETO DE OXALILO

Na experiência que se descreve a seguir, a quimiluminescência surge da sensibilização de moléculas de corantes por um oxidante, que origina estados de maior energia que decaem com emissão de luz. O peróxido de hidrogénio reage com o cloreto

de oxalilo, forma-se um composto intermediário, com libertação de energia. Esta energia é transferida para a molécula de corante, excitando os electrões para um nível energético mais elevado. Quando os electrões regressam ao estado fundamental há emissão de luz. A cor da luz emitida depende da estrutura do corante utilizado (Fig.2).

Materiais	Reagentes
Erlenmeyers de 250 ml	H ₂ O ₂ (10 vol.)
proveta de 50 ml	diclorometano
pipeta de 5 ml	Cloreto de oxalilo
pipeta de 2 ml	Rodamina 6G
espátulas	Rubreno
vidros de relógio	9,10-Difenilantraceno
óculos e luvas de protecção	Tetraceno

Procedimento

- 1 - Preparar uma solução de cada corante, colocando no Erlenmeyer 0,004g de corante, 25 ml de diclorometano e 4 ml de peróxido de hidrogénio a 10 volumes.
- 2 - Preparar a solução de cloreto de oxalilo, colocando num Erlenmeyer 2 ml de cloreto de oxalilo e 50 ml de diclorometano. Esta solução é estável durante um período de tempo considerável, desde que seja mantida rolhada e no escuro.
- 3 - Para melhor observar a quimiluminescência apagar as luzes. Juntar a cada solução de corante 2 ml da solução de cloreto de oxalilo e agitar. O efeito vê-se imediatamente, dependendo do corante a cor, intensidade e duração da mesma, de acordo com a seguinte tabela:

Corante	Cor da luminescência	Duração aproximada
Rubreno	amarelo	2 min.
Rodamina 6G	laranja	30 seg.
Tetraceno	verde	1 min.
9,10-Difenilantraceno	azul	3 min
Mistura ribr./difenilant.	amarelo->azul	40 seg.

Riscos e segurança

O cloreto de oxalilo e o diclorometano são tóxicos. Manusear numa hotte bem ventilada. A toxicidade dos corantes não é exactamente conhecida, pelo que devem ser manuseados com cuidado.

Eliminação de resíduos

As soluções devem ser despejadas no contentor dos solventes halogenados.

Susana Costa pertence ao grupo de Química de Péptidos do Departamento de Química da Universidade do Minho, onde se licenciou em Química- Ramo Controlo de Qualidade Têxtil (1993) e doutorou em Ciências (Química Orgânica) em 1996.

Fernanda Peixoto é licenciada em Ensino de Física e Química (1988) e Mestre em Química- Especialização em Ensino pela Universidade do Minho (1997). Actualmente lecciona na Escola EB-2,3 André Soares, em Braga

Fig. 2 - Estrutura dos corantes utilizados

B - USANDO LUMINOL

Na presença de um agente oxidante (neste caso a lixívia) o luminol é convertido num produto que se encontra no estado excitado. Este decai para o estado fundamental, emitindo luz (Fig.3).

Fig. 3 - Luminescência do luminol

Material	Reagentes
proveta de 100 ml	sol. aq. NaOH 0,1 M
frasco de 500 ml	Luminol
copo de 500 ml	Lixívia comercial
serpentina de vidro ou tubo de plástico transparente	
funil de vidro grande	
ampolas de adição de 100 ml	
espátula	
vidro de relógio	
óculos e luvas de protecção	

Procedimento

1- Preparar a solução de luminol, dissolvendo 0,12 g de luminol em 250 ml de NaOH 0,1 M. Preparar a solução de lixívia colocando 50 ml de lixívia em 200 ml de água.

2- Deitar 100 ml de cada solução na respectiva ampola de adição e juntar em simultâneo para um funil de vidro grande, ligado a uma serpentina de vidro ou tubo de plástico transparente. Não esquecer de apagar as luzes ou diminuir a sua intensidade.

Sugestão: Em vez de lixívia pode usar-se H_2O_2 a 10 volumes, não se fazendo neste caso a diluição com água. Para obter um efeito mais espectacular, deitar alguns cristais de ferricianeto de potássio $K_3[Fe(CN)_6]$ à solução que luminesce, para aumentar a intensidade do brilho (apesar de reduzir a sua duração).

Riscos e segurança

A toxicidade do luminol não é exactamente conhecida. Evitar respirar o pó e o contacto com a pele. O ferricianeto de potássio $K_3[Fe(CN)_6]$ é tóxico e deve evitar-se o contacto com a pele.

Eliminação de resíduos

As soluções devem ser diluídas e despejadas no esgoto.

C - USANDO LUMINOL (MAIS ESPECTACULAR E DURADOURA)

Material	Reagentes
Balão volumétrico de 1 l	H_2O_2 a 10 volumes
copo de 100 ml	Luminol
copo de 500 ml	Na_2CO_3
ampola de adição de 50 ml	$NH_4HCO_3 \cdot H_2O$
espátulas	$CuSO_4$
vidros de relógio	$NaHCO_3$
óculos e luvas de protecção	água destilada

Procedimento

1- Preparar a solução de luminol, dissolvendo 2 g de carbonato de sódio em cerca de 50 ml de água. Juntar 0,1 g de luminol e misturar até dissolver. Adicionar 0,25 g de bicarbonato de amónio e 0,25 g de sulfato de cobre. Agitar até dissolver. Juntar então 12 g de bicarbonato de sódio. Depois de todo dissolvido diluir a solução para 500 ml com água.

2- Deitar cerca de 200 ml da solução de luminol num copo e com a ajuda de uma ampola de adição, juntar gota a gota H_2O_2 a 10 volumes.

Riscos e segurança

A toxicidade do luminol não é exactamente conhecida. Evitar respirar o pó e o contacto com a pele

Eliminação de resíduos

As soluções devem ser diluídas e despejadas no esgoto.

BIBLIOGRAFIA

- H.W. Roesky, K. Mockel, "Chemical Curiosities", VCH, Weinheim, 1996.
- L.R. Summerlin, J.L. Ealy, "Demonstrações de Química-Volume 1", 2ª Ed., SPQ, Lisboa, 1993.
- L.R. Summerlin, C.L. Borgford, J.B. Ealy, "Demonstrações de Química-Volume 2", SPQ, Lisboa, 1988.
- F. McCapra, Z. Razavi, *J. Chem.Soc., Chem.Com.*, **5**, 1976, p.153.

ÍNDICES

INDICE DE AUTORES

Almeida, P.	9
Burrows, Hugh D.	17
Carvalho, Luís H. Melo de	13
Costa, Susana	89
Dias, A. Romão	59
Esteves, Ana P.	83
Falcão, E. M.	83
Fonseca, A.M.	85
Freitas, Ana M.	83
Laszlo, Pierre	67
Martinho, J.M.G.	31
Melo, Eurico	1
Melo, Maria João	41
Moura, João C.V.P.	51
Nascimento, Sérgio M.V.	27
Neves, Maria da Graça P.M.	73
Peixoto, Fernanda	89
Pina, Fernando	41
Pinto, Madalena M.M.	35
Rodrigues, Lígia M.	79
Roque, Ana	41
Teixeira, Clementina	55

ÍNDICE GERAL

Prefácio	v
O Chapéu da Carmen Miranda, <i>Eurico Melo</i>	1
Cianinas: a cor não visível da fotografia, <i>P. Almeida</i>	9
Sistemas que mudam de cor, <i>Luís H. Melo de Carvalho</i>	13
Fotónica Molecular: interações entre luz e sistemas moleculares, <i>Hugh D. Burrows</i>	17
A Cor: dos Fotões aos Neurónios, <i>Sérgio M.V. Nascimento</i>	27
Um Olhar Químico sobre a Visão, <i>J.M.G. Martinho</i>	31
As Cores da Saúde, <i>Madalena M.M. Pinto</i>	35
Systems Fotocrómicos para Escrever-Ler-Apagar: Um futuro colorido para a Memória, <i>Maria João Melo, Ana Roque, Fernando Pina</i>	41
Novas Perspectivas de Tratamento do Cancro: Terapia Fotodinâmica, <i>João C.V.P. Moura</i>	51
Rochas Ornamentais e “Minerais Sintéticos”: Brincando com a Cor, <i>Clementina Teixeira</i>	55
Química (e Cor) de Metalocenos, versão adaptada da Lição Ferreira da Silva, <i>A. Romão Dias</i>	59
Corantes, Pigmentos e Tintas, <i>Pierre Laszlo</i>	67
Porfirinas: da Natureza à Síntese e à Medicina, <i>Maria da Graça P.M. Neves</i>	73
Sessões Experimentais	77
Cor, pigmentos e plantas, <i>Lígia M. Rodrigues</i>	79
Cor e equilíbrio, <i>Ana P. Esteves e Ana M. Freitas</i>	83
Cor e Oxidação-Redução, <i>A.M. Fonseca e E.M. Falcão</i>	85
Cor e luz, <i>Susana Costa e Fernanda Peixoto</i>	89
Índice de Autores	92
Índice Geral	93