Nos vidrados, os seus compostos possibilitam a obtenção de tonalidades luminiscentes, nomeadamente, verde-amarelado com o fosfato de urânio, ou verde-claro, amarelo, laranja e castanho com corantes de urânio. Em vidrados cristalinos, de aplicação restrita ao domínio artístico, conseguem-se particulares resultados estéticos com o uranato sódico, o qual proporciona cristais ocre sobre fundo negro.

No domínio das texturas, relativamente às tácteis, desde 1980 se tem aplicado o nitrato de urânio sob ácido fosfórico para deprimir a cor no corpo porcelânico, deixando a descoberto a sua bran-

cura, ao mesmo tempo que a tonalidade se concentra nos bordos dessa depressão, num efeito de halo. Nas texturas visuais, também a partir desse ano, se tem recorrido a sais solúveis para obter novas soluções expressivas, como cloretos, sulfatos e nitratos, de ferro, cobre e cobalto, para além do dicromato de potássio. Entre eles, o nitrato de urânio é utilizado para se conseguir uma tonalidade ocre, em atmosfera oxidante, ou cinzenta, em redução. Sendo esses sais solúveis, mancham e penetram no corpo cerâmico por vezes até ao outro lado, proporcionando resultados inesperados, tonalidades efusivas, bastante diferentes das obtidas pelos processos

tradicionais. Como têm uma grande fluidez, podem também ser aplicados como caligrafia, sendo o nitrato de urânio, cloreto de ouro, ou de cobalto, os que facultam melhores resultados. Ainda dentro destas texturas, pode-se produzir nos vidrados vermelhos um ponteadado negro saturando a atmosfera de cozedura com vapores de urânio.

Quanto ao acabamento, o urânio é utilizado nos reflexos iridescentes, os chamados lustres, aplicados sobre o vidro já cozido. Com nitrato de urânio obtêm-se efeitos amarelo-esverdeados muito brilhantes, e um amarelo-madrepérola com urânio e bismuto.

Compostos de Urânio

JOÃO PAULO LEAL (*)

O URÂNIO EXISTE NA NATUREZA EM MINERAIS com uma enorme variedade de composições. Podem citar-se alguns exemplos apenas para ilustrar esta variedade: a uraninite (óxido de urânio, UO_2), a andersonite (carbonato de sódio, cálcio e urânio hidratado, $\text{Na}_2\text{CaUO}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), a autunite (fosfato de cálcio e urânio hidratado, $\text{Ca}(\text{UO}_2)_2(\text{PO}_4)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) e a tyuyamunita (vanadato de cálcio e urânio hidratado, $\text{Ca}(\text{UO}_2)_2(\text{VO}_4)_2 \cdot (\text{H}_2\text{O})_{5,8}$). Na Figura 1 apresenta-se um exemplar de boltwoodite (hidroxosilicato de potássio e urânio hidratado) de enorme beleza.

A variedade de compostos inorgânicos é também grande, sendo reflexo dos diferentes estados de oxidação que o urânio pode apresentar: urânio metálico (0), UCl_3 (III), UO_2 (IV), UF_5 (V) ou $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ (VI).

figura 1 Exemplar de Boltwoodite

* e-mail: jpleal@itn.p. Departamento de Química; Instituto Tecnológico e Nuclear

figura 3 Representação do composto $U(T_p^{Me_2})Cl_3$. O átomo de urânio está representado a vermelho.

No Departamento de Química (DQ) do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) tem-se desenvolvido um trabalho relevante a nível dos compostos intermetálicos e organometálicos de urânio. Sendo os compostos intermetálicos abordados numa outra comunicação, daremos especial ênfase aqui aos compostos organometálicos.

O urânio, nos vários estados de oxidação, forma compostos estáveis quando a sua esfera de coordenação se encontra preenchida, isto é, é necessário "recobrir" todo o átomo de urânio para que o composto seja estável. Sendo o átomo de urânio um átomo grande são necessários compostos volumosos para atingir este objectivo. Os ligandos mais utilizados para este fim têm sido o ciclopentadienilo (cp) e seus derivados e os

vários polipirazolilboratos (Tp) (Figura 2). Sobre este último tipo de ligandos, o mais utilizado nos nossos laboratórios, aconselha-se a leitura da referência 1.

A título de exemplo apresenta-se na Figura 3 o composto $U(T_p^{Me_2})Cl_3$ visto pelo eixo urânio-boro em que se observa que o urânio está praticamente todo tapado excepto numa pequena zona entre os três átomos de cloro. Apesar de ser o preenchimento da sua esfera de coordenação que lhe garante a sua estabilidade, é o facto de ter alguma zona ainda livre que lhe permite possuir alguma reactividade e com isso uma química extremamente rica [1,2].

Estes compostos têm sido estudados no que concerne à sua estrutura, reactividade e também à energética das ligações. Na Figura 4 apresentam-se os valo-

res das entalpias de dissociação de algumas ligações ao urânio em compostos da família $U(T_p^{Me_2})Cl_2L$. Estes valores permitem compreender a reactividade observada e prevê novas vias de síntese ou padrões de reactividade para estes compostos [3-5].

Os estudos efectuados mostram que os compostos organometálicos de urânio têm uma química muito rica e uma reactividade única, sendo desejável que a investigação nesta área seja continuada e se possível reforçada.

figura 4 Entalpias de dissociação homolítica urânio-ligando nos compostos $U(T_p^{Me_2})Cl_2L$.

figura 2 (a) Ligando ciclopentadienilo ($R_1-R_5=H$) ou derivados do mesmo com alguns ou todos os hidrogénios substituídos, (b) Ligando polipirazolilborato em que um dos grupos R_1 ou R_2 pode ser substituído.

Referências

1. I. Santos, N. Marques *New J. Chem.* **1995**, *19*, 551.
2. M. Silva, A. Domingos, A. Pires de Matos, N. Marques, S. Trofimenko *J. Chem. Soc. Dalton Trans.* **2000**, 4628.
3. J. P. Leal, N. Marques, A. Pires de Matos, M. J. Calhorda, A. M. Galvão e J. A. Martinho Simões *Organometallics* **1992**, *11*, 1632.
4. J. P. Leal, J. A. Martinho Simões *J. Chem. Soc. Dalton Trans.* **1994**, 2687.
5. J. P. Leal, N. Marques, J. Takats, submetido para publicação.

European Journal of Organic Chemistry

Benefit from:

- Full-text available online for subscribers (www.interscience.wiley.com)
- strong international coverage
- faster publication times: articles available online weeks before print edition
- cutting-edge research and information
- low personal subscription rate for members of supporting societies

***doubled publication frequency:
24 issues from 2000***

supported and owned by Chemical Societies from

B • D • E • F • GR • I • NL • P

*To order please contact your society
or EJIC-EJOC@wiley-vch.de*

WILEY-VCH

A importância dos compostos intermetálicos de urânio para a Ciência

A. P. GONÇALVES, M. ALMEIDA (*)

NESTA COMUNICAÇÃO SERÃO APRESENTADOS sucintamente alguns exemplos de contribuições dadas pelos compostos intermetálicos de urânio para o avanço da Ciência em geral e para o estudo da matéria condensada em particular.

Ao contrário das ligas metálicas, que consistem numa solução sólida desordenada, com um ou mais elementos metálicos, sem composição química particular e muitas das vezes constituídas por misturas de fases, os compostos intermetálicos tem uma fórmula química bem determinada e são constituídos por dois ou mais elementos metálicos que ocupam posições cristalográficas distintas e bem definidas. Entre a grande família dos compostos intermetálicos existe um interesse especial no estudo dos compostos de urânio como se irá mostrar.

Uma primeira observação da Tabela Periódica podia levar a pensar que os actínídeos se comportam de maneira semelhante aos lantanídeos. Contudo, o comportamento duma propriedade tão simples como o volume molar, mostra que esta grandeza no caso dos metais de transição tem uma variação aproximadamente parabólica com o número atómico, reflectindo a contribuição dos electrões *d* para a ligação química, enquanto que nos lantanídeos se mantém aproximadamente constante, devido à não participação dos electrões *4f* nas ligações. Já nos actínídeos esta variação é intermédia entre os dois casos anteriores, sendo parabólica para os actínídeos

leves e tomando um valor aproximadamente constante para maiores números atómicos. Esta natureza intermédia é devida à maior extensão das orbitais *5f*, quando comparadas com as orbitais *4f*, o que permite a participação dos electrões *5f* nas ligações químicas dos actínídeos leves e cria uma enorme riqueza de comportamentos químicos e físicos dos seus compostos.

Uma contribuição importante dos compostos intermetálicos de urânio para o estudo da matéria condensada em geral e para a cristalochimica em particular, deriva do grande número de estruturas tipo com urânio. A classificação estrutural dos compostos intermetálicos, é importante para uma futura previsão e "desenho" de compostos com propriedades predeterminadas, mas requer a existência de estudos cristalochimicos aprofundados. O estudo sistemático de novas estruturas leva à descoberta de novos tipos de vizinhanças atómicas e ao estabelecimento de relações estrutura-propriedades, que tem já permitido a previsão e a síntese de novos compostos intermetálicos.

Além de existirem muitas estruturas tipo inicialmente identificadas em compostos com urânio, em geral com elevado número de coordenação por elementos mais leves, este elemento ocorre também num grande número de outros tipos de estruturas descritas inicialmente com outros elementos. Como exemplo, pode-se referir que apenas com a estrutura tipo Fe_2P (ZrNiAl) são conhecidas duas dezenas de compostos intermetá-

licos de urânio. O estudo sistemático das propriedades cristalográficas e físicas de compostos intermetálicos isoestruturais conduz também ao estabelecimento de novas relações estrutura-propriedades.

Um primeiro resultado da tentativa de estabelecer uma correlação entre as estruturas e as propriedades físicas de compostos intermetálicos de urânio foi o diagrama de Hill para compostos binários. Assim, Hill verificou que, em geral, o aparecimento de ordem magnética em compostos binários de urânio dependia fundamentalmente da distância urânio-urânio. O aparecimento de comportamento antiferro ou ferromagnético praticamente só ocorria para distâncias U-U acima de $3.5 \pm 0.1 \text{ \AA}$, enquanto que abaixo deste valor os compostos eram normalmente paramagnéticos. Este tipo de comportamento foi depois explicado como devido à sobreposição das orbitais *5f*, favorecida abaixo do limite de Hill, que não permite o carácter localizado dos electrões *5f* e, consequentemente, dificulta o estabelecimento da ordem magnética. Contudo, o aparecimento de um número cada vez maior de excepções, principalmente em compostos intermetálicos ternários, levou a que se tivessem de considerar outro tipo de interações para além da sobreposição directa *5f-5f*, nomeadamente a hibridação entre as orbitais *5f* dos átomos de urânio e as orbitais *d* ou *p* dos seus vizinhos próximos.

O estudo de compostos intermetálicos de urânio também levou à descoberta

* Departamento de Química, Instituto Tecnológico e Nuclear, P-2686-953 Sacavem, Portugal