Química para os mais novos

Marta C. Corvo

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
marta.corvo@fct.unl.pt

Introdução

A atividade proposta nesta edição pretende demonstrar as reações endotérmicas e exotérmicas. Inspirados na vaga de calor que se faz sentir, a ocorrência de uma reação química permitirá observar, entre outras evidências, a variação de calor.

O calor da reação

Material:

- Hidrogenocarbonato de sódio
- Refresco de laranja em pó (1 saqueta)
- Fermento de padeiro seco (1 saqueta)
- Peróxido de hidrogénio
- Água
- Colher de sopa
- Copo de medida
- Copos transparentes (2)
- Tabuleiro
- Termómetro

Nota: o hidrogenocarbonato de sódio pode encontrar-se em supermercados com a designação bicarbonato de sódio. O peróxido de hidrogénio pode encontrar-se em supermercados com a designação água oxigenada. Como termómetro poderá utilizar-se um termómetro de aquário. O refresco de laranja deverá conter ácido cítrico (E330).

Procedimento:

1. Identificar um copo transparente com **solução A** e outro com **solução B**.
2. Medir 100 ml de água à temperatura ambiente e transferir para o copo da **solução A**.
3. Adicionar a este copo 2/3 da saqueta de refresco de laranja em pó. Mexer até dissolver completamente.
4. Colocar o termómetro no meio da solução, sem encostar no fundo ou nas paredes e medir a temperatura (depois de esperar cerca de 60 segundos com o termómetro na solução para estabilizar).

5. Medir $\frac{1}{4}$ de copo de hidrogenocarbonato de sódio.
6. Colocar o copo da **solução A** dentro de um tabuleiro e adicionar o hidrogenocarbonato à solução rapidamente.
7. Quando a libertação gasosa começar a diminuir, medir novamente a temperatura.

8. Medir 100 ml de água à temperatura ambiente e transferir para o copo da **solução B**.
9. Adicionar uma saqueta de fermento em pó a este copo, e misturar com o auxílio da colher.
10. Colocar o termómetro no meio da solução, sem encostar no fundo ou nas paredes, e medir a temperatura.

11. Medir 100 mL de peróxido de hidrogénio para o copo de medida.
12. Colocar o copo da **solução B** dentro do tabuleiro e adicionar o peróxido de hidrogénio.
13. Quando a libertação gasosa começar a diminuir, medir novamente a temperatura.

Explicação:

Quando adicionámos o hidrogenocarbonato de sódio à solução de sumo de laranja, e também quando adicionámos o peróxido de hidrogénio à solução de fermento, houve imediatamente libertação gasosa, o que nos indica que ocorreu uma reação química em ambos os casos. Nas duas reações observámos também uma variação de temperatura. Às vezes, as reações químicas entre duas ou mais substâncias libertam energia, outras vezes absorvem - muitas vezes sob a forma de calor. As reações que libertam energia dizem-se exotérmicas, este é o caso da reação entre o fermento e o peróxido de hidrogénio – durante a reação é libertada energia térmica e por isso a temperatura aumenta. Nas reações endotérmicas, a energia térmica é removida pela reação ("recolhida") e a temperatura diminui – este é o caso da reação entre o hidrogenocarbonato de sódio e o ácido cítrico (um dos componentes do sumo de laranja).

Bibliografia

[1] Adaptado de <http://blog.growingwithscience.com/2015/01/easy-exothermic-and-endothermic-chemical-reactions-for-kids/> consultado em 31 de agosto de 2018.