tão em processo de produção para a vacinação em massa, o número modesto de antivirais em uso ou em desenvolvimento para qualquer doença mostra os desafios do desenvolvimento deste tipo de fármaco.

Uma equipa multidisciplinar que inclui investigadores da Universidade de Nottingham, da Agência de Saúde Vegetal e Animal e do *Pirbright Institute*, Reino Unido, e do Laboratório de Epidemiologia Animal da China descobriram uma nova propriedade antiviral de um fármaco, o que pode ter grandes implicações no modo como serão geridas pandemias futuras, incluindo a de COVID-19. O estudo mostra que a tapsigargina, uma lactona sesquiterpénica que pode ser extraída da planta *Thapsia garganica*, em pequenas doses, desencadeia uma resposta imune inata antiviral, centrada no hospedeiro e altamente eficaz contra três tipos principais de vírus respiratórios humanos, o SARS-CoV-2, o vírus sincicial respiratório (VSR) e o vírus da gripe A. Os investigadores descobriram que a tapsigargina é eficaz contra a infeção viral quando usada antes ou durante a infeção ativa, sendo capaz de impedir que um vírus se replique nas células durante, pelo menos, 48 horas após uma única exposição de 30 minutos. Revelaram que este composto é estável ao pH ácido do estômago pelo que pode ser tomado por via oral, e por isso sem necessidade de injeções ou internamento hospitalar. Para além disso, não evidenciou sensibilidade à resistência do vírus, sendo, pelo menos, várias centenas de vezes mais eficaz do que as opções antivirais atuais.

O investigador responsável Kin-Chow Chang, afirmou: *"Embora ainda estejamos nas etapas iniciais da pesquisa sobre este antiviral e o seu impacto no modo como doenças causadas por vírus como o SARS-CoV-2 podem ser tratadas, estas descobertas são extremamente significativas. A pandemia atual evidencia a necessidade de antivirais eficazes para tratar infeções ativas, bem como vacinas, para prevenir a infeção. Dado que as futuras pandemias muito provavelmente serão de origem animal, onde ocorre a propagação de animal para humano (zoonótica) e zoonótica reversa (humano para animal), uma nova geração de antivirais, como a tapsigargina, pode desempenhar um papel fundamental no controlo e tratamento de infeções virais importantes em humanos e animais."*

Crédito: Drug Target Reviews

Estrutura da tapsigargina

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

Fontes

Thapsigargin could be used as antiviral to treat COVID-19, study shows, drugtargetreview.com/news/82424/thapsigargin-could-be-used-as-antiviral-to-treat-covid-19-study-shows (acedido em 03/02/2021).

S. Al-Beltagi, C. A. Preda, L. V. Goulding, J. James, J. Pu, P. Skinner, Z. Jiang, B. L. Wang, J. Yang, A. C. Banyard, K. H. Mellits, P. Gershkovich, C. J. Hayes, J. Nguyen-Van-Tam, I. H. Brown, J. Liu, K.-Chow Chang, *Viruses* **2021**, 13, 1–20. DOI: 10.3390/v13020234.

Citronamina A Isolada de uma Esponja Marinha

Ao longo dos séculos a descoberta de produtos naturais biologicamente ativos facilitou o desenvolvimento de fármacos para combater várias doenças, nomeadamente a malária. A malária é uma doença transmitida por mosquitos, que está disseminada nas regiões tropicais e subtropicais, sendo provocada pelo parasita

Plasmodium. Estirpes resistentes deste parasita conduziram à necessidade de desenvolvimento de novas opções de tratamento. A esponja marinha australiana *Citronia astra* (família *Dysideidae*) mostrou ser uma fonte de diversos compostos biologicamente ativos com estruturas e atividades diversas.

Anthony R. Carroll (Universidade Griffith, Southport, Austrália) e colegas isolaram a citronamina A (na imagem), um alcaloide isoquinolínico, de *Citronia astra*, determinaram a sua estrutura e investigaram a sua atividade contra o parasita causador da malária. A equipa de investigação extraiu 10 kg da esponja marinha com água e usou cromatografia em coluna para separar os compostos do extrato bruto. A citronamina A foi obtida na forma do derivado trifluoroacetato. A estrutura deste novo composto, que apresenta um sistema pentacíclico não habitual e uma unidade do tipo isoquinolina, foi elucidada por espectrometria de massa de ionização por *electrospray* de alta resolução (HRESIMS), espectroscopia de ressonância magnética nuclear de ^1H ($^1\text{H-NMR}$) e de ^{13}C ($^{13}\text{C-NMR}$) e espectroscopia de dicroísmo circular eletrónico (ECD). Como os derivados de isoquinolina podem apresentar propriedades antiplasmódicas, os investigadores testaram a citronamina A que apresentou atividade moderada contra estirpes sensíveis a fármacos e estirpes resistentes a fármacos do parasita *Plasmodium falciparum*, responsável pela malária.

Crédito: Chemistry Views

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

Fontes

Citronamine A Isolated from Marine Sponge, chemistryviews.org/details/news/11281088/Citronamine_A_Isolated_from_Marine_Sponge.html (acedido em 23/12/2020).

D. W. Prebble, D. C. Holland, L. P. Robertson, V. M. Avery, A. R. Carroll, *Org. Lett.* **2020**, 22, 9574-9578. DOI: 10.1021/acs.orglett.0c03633.

Remoção Seletiva de Metais Pesados de Águas Residuais Ácidas

Crédito: Chemistry Views

Grandes quantidades de águas residuais ácidas ($\text{pH} < 2$) com concentrações elevadas de arsénio e de metais pesados (por ex., Cu, Hg, etc.) são produzidas por processos industriais, nomeadamente fundição de metais não ferrosos e processamento de minerais. Esta água fortemente contaminada representa um risco ambiental grave e requer tratamento extensivo. Um procedimento estabelecido para tratar este tipo de efluente baseia-se na neutralização do ácido com cal e no armazenamento dos contaminantes na forma sólida. Uma outra opção consiste na precipitação dos metais pesados e de arsénio na forma de sulfuretos usando o H_2S gerado a partir dos sais de sulfureto. No entanto, ambos os métodos têm desvantagens. A neutralização origina grandes quantidades de resíduos sólidos e os sulfuretos sofrem hidrólise facilmente em meio fortemente ácido, ocorrendo libertação de H_2S , que é tóxico.

Xianjia Peng, da Universidade da Academia Chinesa de Ciências (Pequim), e colegas desenvolveram um processo para remover arsénio e metais pesados de águas residuais fortemente ácidas por meio da