Desenvolvimento de uma Reação “Fosfa-Bora-Wittig”

Na reação de Wittig, um aldeído ou cetona é convertido num alceno por meio de uma reação com um íleto de fósforo. Os fosfalcenos ($RR'C=PR''$) são muito semelhantes aos alcenos. As eletronegatividades do carbono e do fósforo são próximas, o que torna as ligações π C=P estrutural e quimicamente semelhantes aos alcenos, embora com menor diferença de energia entre a HOMO e a LUMO, consequência de uma ligação π 2p-3p mais fraca. Como a substituição de uma ligação C=C por uma ligação C=P altera as energias das orbitais de fronteira sem polarizar de modo significativo o sistema π , os fosfalcenos são blocos atrativos para a construção de novas moléculas e materiais π -conjugados.

Os fosfalcenos são preparados, geralmente, por métodos que requerem uma ligação σ P-C preexistente. Assim, uma reação análoga à reação de Wittig, que forme a ligação P=C e origine fosfalcenos, pode ser útil. Reagentes “fosfa-Wittig” para este tipo de reação estão disponíveis, mas a reação está menos bem desenvolvida do que a reação de Wittig, os reagentes podem ser difíceis de preparar e a diversidade do substrato pode ser limitada.

Michael J. Cowley (Universidade de Edimburgo, Reino Unido) e colegas desenvolveram uma reação “fosfa-bora-Wittig”, na qual o fosfoboreno transiente $[Mes^*P=BNR_2]$ ($Mes^* = 2,4,6$ -tri-*tert*-butilfenil; $NR_2 = 2,2,6,6$ -tetrametilpiperidina) reage com compostos de carbonilo, originando fosfalcenos do tipo $RR'C=PMes^*$ (esquema). O fosfoboreno foi gerado *in situ* a partir de um precursor difosfadioboretano dimérico, e reagiu com diferentes aldeídos, cetonas, ésteres ou amidas, em benzeno a 80 °C, para originar o

produto de cicloadição formal [2+2] correspondente, um 1,2,3-fosfaboraoxetano. A adição de $AlBr_3$ levou à abertura de anel pretendida, originando os fosfalcenos correspondentes e $[R_2NBO]_n$ como subproduto.

A reação desenvolvida conduziu à formação de fosfalcenos novos e conhecidos, permitindo, assim, alargar o âmbito das reações do tipo “fosfa-Wittig”. De acordo com os investigadores, o seu trabalho continua visando a aplicação desta reação a reagentes com outros substituintes no átomo de fósforo.

Crédito: ChemistryViews

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

Fontes

Phospha-Bora-Wittig Reaction Developed, chemistryviews.org/details/news/11316475/Phospha-Bora-Wittig_Reaction_Developed.html (acedido em 04/09/2021).

A. M. Borys, E. F. Rice, G. S. Nichol, M. J. Cowley, *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, 143, 14065-14070. DOI: 10.1021/jacs.1c06228.

Amino-hidroximetileno

O amino-hidroximetileno (amino-hidroxicarbeno) é um carbeno estabilizado, com relevância astroquímica, e que nunca foi identificado espectroscopicamente. Enquanto que diaminocarbenos e, especialmente, carbenos *N,N*-heterocíclicos são usados de forma ubíqua como ligandos e catalisadores, os aminooxicarbenos são muito menos populares, muito provavelmente pela sua reatividade, apesar da elevada entalpia de estabilização isodésmica da espécie “parental” correspondente.

Peter R. Schreiner e colegas (Universidade Justus Liebig, Gießen, Alemanha) geraram, isolaram e caracterizaram o anteriormente desconhecido amino-hidroximetileno em Ar sólido, via pirólise da

Crédito: ChemistryViews

monoamida do ácido oxálico. O amino-hidroximetileno é o aminooxicarbeno mais simples, um isômero da formamida e do ácido formimídico. Os investigadores verificaram que o aminooxicarbeno é estável em condições criogénicas e a sua decomposição em $\text{HNCO} + \text{H}_2$ e $\text{NH}_3 + \text{CO}$ só ocorre quando o confórmero *trans* é irradiado a 254 nm. Este resultado contrasta com outros hidroxicarbenos e aminometileno, que sofrem migrações [1,2]-H originando os carbonilos ou iminas correspondentes. Devido à estabilização muito significativa do heteroátomo, o efeito de túnel mecânico quântico (QMT, do inglês *quantum mechanical tunneling*) do confórmero *trans* para formamida ou ácido formimídico não ocorre em escala de tempo de laboratório, mas pode ser relevante

em processos astroquímicos, de acordo com os investigadores. Os dados experimentais são bem suportados pelos resultados dos cálculos CCSD(T)/cc-pVTZ e B3LYP/6-311++G(3df, 3pd).

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

Fontes

Aminohydroxymethylene, chemistryviews.org/details/news/11313638/Aminohydroxymethylene.html (acedido em 04/09/2021).

B. Bernhardt, M. Ruth, H. P. Reisenauer, P. R. Schreiner, *J. Phys. Chem. A* **2021**, 125, 7023–7028. DOI: 10.1021/acs.jpca.1c06151.

Fluoração de 2H-Indazoles

A prevalência de compostos organofluorados em quase todas as áreas da química, em particular em química medicinal, em química de materiais e na agricultura, inspirou os químicos orgânicos a desenvolver vários métodos para a formação da ligação C–F como resposta às necessidades dos setores agroquímico e farmacêutico. O flúor ocupa uma posição de destaque, em especial na conceção de fármacos. A introdução de flúor em moléculas orgânicas cria a possibilidade de melhorar a estabilidade metabólica e a capacidade de modulação da lipofilia. Os átomos de flúor podem ser introduzidos usando reagentes como fluoreto de tetrabutilamónio (TBAF, do inglês *tetrabutylammonium fluoride*), Selectfluor® ou *N*-fluorobenzenossulfonimida (NFSI, do inglês *N-fluorobenzenesulfonimide*). Este último composto é particularmente útil por ser um sólido estável, não higroscópico e de fácil manuseamento.

Payel Ghosh e Alakananda Hajra (Universidade Visva-Bharati, Santiniketan, Índia) desenvolveram um método de fluoração simples, e sem utilização de metais, de 2H-indazoles, em água, usando NFSI como fonte de flúor. As reações foram realizadas em água, a 80 °C, com tempos de reação que variaram de 15 min a 8 h, dependendo do substrato. Vários derivados de 2-fenil-2H-indazole, de 2-benzil-2H-indazole e um 2H-indazole com um grupo *terc*-butilo na posição *N*-2 foram convertidos, com sucesso, aos respetivos compostos fluorados. Estes derivados foram obtidos,

Crédito: ChemistryViews

geralmente, com rendimentos moderados a bons e com boa regiosseletividade para a posição C-3. O protocolo experimental usa água como solvente e pode ser realizado numa escala de grama.

>

Ana Paula Esteves

aesteves@quimica.uminho.pt

Fontes

Fluorination of 2H-Indazoles, chemistryviews.org/details/news/11311345/Fluorination_of_2H-Indazoles.html (acedido em 28/07/2021).

P. Ghosh, A. Hajra, *J. Org. Chem.* **2021**, 86, 10883–10888. DOI: 10.1021/acs.joc.1c01253.