Azevinho

Marta Pineiro

mpineiro@qui.uc.pt

O azevinho (*Ilex aquifolium*) é um arbusto de folha persistente ou perene e, portanto, mantém as suas folhas durante todo o ano. Porém, quando realmente capta a nossa atenção é no inverno, quando podemos apreciar os seus característicos frutos vermelhos. Associamos o azevinho ao Natal, associação esta que tem as suas origens nas práticas do paganismo pré-cristão da Europa. A capacidade do azevinho resistir ao frio e à neve era interpretada como símbolo de imortalidade e proteção. Na mitologia Celta, dizia-se que trazer azevinho para casa era sinónimo de abrigar do frio os espíritos da floresta que, em troca, seriam gentis com a família. Os cristãos também penduravam azevinho nas portas das suas casas como forma de proteção. Este terá sido um dos motivos que levou à sua associação ao Natal.

A utilização como ornamento característico da quadra natalícia, em janelas e portas, coroas, arranjos florais e centros de mesa, levou a uma procura intensa e indiscriminada, o que colocou esta espécie em perigo de extinção. O azevinho é uma espécie protegida desde 1989, o que ajudou à sua recuperação sendo, hoje em dia, uma espécie presente nas Serras do Larouco, Barroso, Padrela, Alvão, Marão, Montemuro e Lapa, entre outras regiões florestais.

Estudos realizados com amostras de folhas, galhos e cascas de árvores de azevinho das regiões da Toscana e da Lombardia (Itália) parecem indicar a capacidade especial do azevinho para acumular, preferencialmente, cádmio e zinco. A quantidade presente de cada metal varia, dependendo do órgão vegetal e do estágio vegetativo da planta, mas podem ser atingidos valores até 16 e 1400 µg de cádmio e zinco, respetivamente, por grama de amostra após secagem. A acumulação de chumbo é muito baixa, sendo os maiores teores de chumbo recuperados na parte externa da casca.

O género *Ilex* é conhecido pelas suas inúmeras atividades biológicas. A maioria das plantas deste género são fontes ricas de triterpenos e saponinas. Além disso, também contém flavonoides, alcaloides, antocianinas e outros compostos fenólicos em pequenas quantidades. Os extratos das folhas de *Ilex aquifolium* foram usados para tratar febres intermitentes, reumatismo ou como agentes expetorantes, exibindo atividade antibacteriana moderada. Estes extratos contêm os triterpenos ácido ursólico e ácido oleanólico em percentagens de 1,3 e 0,5% em

relação à massa das folhas secas, respetivamente. Estes dois triterpenos foram associados a uma ampla gama de atividades biológicas, incluindo antibacteriana, antifúngica, antitumoral, antiviral, anti-inflamatória, antioxidante, antipirética, antidiabética e anti-hipertensiva, entre outras. Adicionalmente, o ácido ursólico também possui atividade antirrugas, comparável à dos retinoides e, portanto, é apreciado no domínio da cosmética.

No entanto, a *Ilex aquifolium* também pode ser tóxica. Por exemplo, foi relatado que crianças foram envenenadas após ingerir os frutos do azevinho comum e tiveram sintomas como diarreia, vômitos e distúrbios gastrointestinais, que são associados à presença de um cianoglicosídeo, o (Z)-1-cianometileno-(4R)-hidroxi-(6S)-(β-D-glucopiranosilo)-2-ciclo-hexeno, também conhecido como menisdaurina.

É evidente que o azevinho é muito mais do que um ornamento do Natal e, como muitas outras espécies de plantas, contém uma riqueza única.

Saiba mais em:

P. C. Legittimo, L. Ducceschi, M. Martini, *Chem. Ecol.* **1998**, 14, 107-121. DOI: 10.1080/02757549808035546.

A. Nahrstedt, V. Wray, *Phytochem.*, **1990**, 29, 3934-3936. DOI: 10.1016/0031-9422(90)85364-L.

S. K. Kothiyal, S. C. Sati, M. S. M. Rawat, M. D. Sati, D. K. Semwal, R. B. Semwal, A. Sharma, B. Rawat, A. Kumar, *Nat. Prod. J.* **2012**, 2, 212-224. DOI: 10.2174/2210315511202030212.